



۱. اگر ماتریس A همگرا باشد کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد A درست است.

الف $\rho(A) > 1$

ب $\|A\|_\infty = 0$

ج $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\| = 0$

۲. اگر A یک ماتریس باشد کدام گزینه صحیح است.

الف $\rho(A) \leq \|A\|$

ب $\det(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

ج $\text{tr}(I_n) = 1$

د $\text{tr}(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$

۳. اگر ماتریس مربع A در رابطه $A^2 + A + I = 0$ صدق کند آنگاه A^{-1} کدام است؟

الف $(A + I)^{-1}$

ب $-(A^2 + A)$

ج $-A^2 - A$

۴. کدامیک از گزینه‌های زیر درست است.

الف $\text{tr}(A^2) = 0$

ب اگر A یک ماتریس حقیقی و متقارن باشد آنگاه مقادیر ویژه A صفر یا موهومی محسن اند.

ج هرگاه A یک ماتریس معین مثبت و یا اکیدا قطر غالب باشد آنگاه A نامنفرد است.

د بردارهای ویژه ماتریس‌های A و A^{-1} یکسان نیستند.

۵. کدامیک از ماتریس‌های زیر هرمیتی است.

الف $\begin{bmatrix} 5-i & 5+i \\ 2-i & 2+i \end{bmatrix}$

ب $\begin{bmatrix} 5 & 6-i \\ 6-i & 3 \end{bmatrix}$

ج $\begin{bmatrix} 4-i & 5 \\ 5 & 3+i \end{bmatrix}$

د $\begin{bmatrix} 2 & 3-i \\ 3+i & 3 \end{bmatrix}$

۶. عباری بردار $x = (2, -1, -2, 1)$ مقدار $\|x\|_5$ را پیدا کنید.

الف $\sqrt[5]{10}$

ب $\sqrt[5]{66}$

ج د صفر

۷. اگر برای بدست آوردن دترمینان ماتریس زیر از محورگیری کلی استفاده شود عنصر محوری در مرحله اول کدام خواهد بود؟

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & -6 & 7 \\ 2 & 3 & -9 & 1 \\ 4 & 3 & -5 & 2 \\ 3 & 6 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

الف ۸

ب ۳

ج ۹

د -۹



۱۸. اگر برای حل دستگاه $\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$ استفاده شود. مقدار $x^{(2)}$ کدام است؟

(الف) $\left(\frac{4}{3}, \frac{-5}{3}, \frac{-2}{3}\right)$ (ج) $\left(\frac{34}{9}, \frac{13}{9}, \frac{28}{9}\right)$ (ب) $\left(\frac{-34}{9}, \frac{13}{9}, \frac{-28}{9}\right)$ (۴,۳,۴)

۱۹. اگر بخواهیم ماتریس $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ را با استفاده از تجزیه دو لیتل به حاصلضرب LU تجزیه کنیم دو ماتریس L و U کدامند؟

(الف) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(ب) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(ج) $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 2\sqrt{2} & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{-1}{2} \end{bmatrix}$

۲۰. ماتریس تکرار با استفاده از روش گاووس سایدل کدام است؟ (U, D, L) بخش های پایین مثلثی، قطری، بالا مثلثی A می باشند).

(الف) $-D^{-1}(L+U)$

(ب) $-(L+D)U^{-1}$

(ج) $-(L+D)^{-1}U$

۲۱. اگر T ماتریس تکرار در روش SOR و λ_i مقدار ویژه ماتریس B گاووس سایدل باشد در این صورت مقدار ویژه T کدام خواهد بود؟

(الف) $-w(1-\lambda_i)$

(ب) $w\lambda_i$

(ج) λ_i

۲۲. مجموع و حاصلضرب مقادیر ویژه ماتریس $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ کدام گزینه است.

(الف) $\prod_{i=1}^n \lambda_i = 26$ ، $\sum_{i=1}^n \lambda_i = -7$

(الف) $\prod_{i=1}^n \lambda_i = -7$ ، $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 26$

(ب) $\prod_{i=1}^n \lambda_i = -26$ ، $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 7$

(ج) $\prod_{i=1}^n \lambda_i = 7$ ، $\sum_{i=1}^n \lambda_i = -26$

۲۳. اگر A یک ماتریس معین مثبت و سه قطری باشد و $\rho(B_g) = 0/75$ در اینصورت بهترین انتخاب w با روش SOR کدام است؟

(الف) $1/33$

(ب) $1/5$

(ج) $1/65$

(د) $0/25$



۱۴. برای ماتریس $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 2 & -6 & 4 \\ 5 & -1 & -2 \end{bmatrix}$ دوایر قضیه گرشگورین کدامند؟

الف) $R_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 3| \leq 4\}$, $R_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z + 6| \leq 6\}$, $R_3 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z + 2| \leq 4\}$

ب) $R_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 3| \leq 6\}$, $R_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z + 6| \leq 6\}$, $R_3 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z + 2| \leq 6\}$

ج) $R_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 3| \leq 6\}$, $R_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 6| \leq 6\}$, $R_3 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 2| \leq 6\}$

د) $R_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 3| \leq 4\}$, $R_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 6| \leq 6\}$, $R_3 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 2| \leq 4\}$

۱۵. کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف) $\rho(A) \leq \|A\|_{\infty} \leq \|A\|_1$

ب) $\rho(A) \geq \min(\|A\|_1, \|A\|_{\infty})$

ج) اگر A یک ماتریس متقارن و معین نامنفی باشد آنگاه: $\rho(A) = \frac{\max X^t A X}{\|X\|_2 = 1}$

د) $\rho(A) \leq \|A\|_1 \leq \|A\|_{\infty}$

۱۶. ماتریس $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ را در نظر بگیرید، کدام گزینه $\|A\|_2$ می باشد؟

د ۷

ج ۱۶

الف) $\sqrt{7}$

۱۷. درمورد یافتن نزدیکترین مقدار ویژه A به عدد P کدام گزینه درست است؟

الف) با روش توانی، بزرگترین مقدار ویژه $A - PI$ از نظر قدر مطلق محاسبه می شود.

ب) با روش معکوس توانی، کوچکترین مقدار ویژه $(A - pI)$ از نظر قدر مطلق محاسبه می شود.

ج) با روش معکوس توانی، بزرگترین مقدار ویژه $A - PI$ از نظر قدر مطلق محاسبه می شود.

د) با روش توانی، کوچکترین مقدار ویژه $A - pI$ از نظر قدر مطلق محاسبه می شود.

۱۸. بزرگترین مقدار ویژه ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ از نظر قدر مطلق با فرض $Y^0 = (1, 1)^t$ به روش توانی در مرحله اول کدام است؟

د) $\frac{13}{5}$

ج) ۳

ب) ۶

الف) ۵

۱۹. ضرایب چند جمله ای $p(\lambda)$ در $p_n = -\frac{1}{n}(s_n + p_1 s_{n-1} + \dots + p_{n-1} s_1)$ که از رابطه $p(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_n$ قابل

محاسبه است در کدام روش مورد استفاده قرار می گیرد.

الف) روش LR ب) روش کریلف ج) روش ضرایب نا معین د) روش لوریبر

۲۰. کدام گزینه برای ماتریس هاووس هولدر صحیح است؟

$$P^t = -P$$

$$P = VV^t - I_n$$

د) ماتریس هاووس هولدر P یک ماتریس متعامد است.

$$P^t = P$$



سوالات تشریحی

بارم هر سوال ۲ نمره است

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

۱. نشان دهید که ماتریس A معین مثبت است.

۲. با استفاده از روش چولسکی ماتریس A در سوال ۱ را به حاصلضرب LL^t تجزیه کنید.

۳. ثابت کنید اگر $C \neq 0$ و $X^{(K)} = BX^{(K-1)} + C$ آنگاه بازای هر انتخاب $X^{(0)}$ دنباله $X^{(k)}$ به بردار X (جواب دستگاه همگرا خواهد بود اگر و فقط اگر $\rho(B) < 1$)

۴. با استفاده از روش کریلوف و انتخاب بردار اولیه $Y^{(\circ)} = (1, 0, 0, 0)^t$ چند جمله‌ای مشخصه ماتریس زیر را بدست آورید.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

۵. دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول زیر را حل کنید

$$\frac{du_1(t)}{dt} = 2u_1(t) + 3u_2(t) + 2u_3(t)$$

$$\frac{du_2(t)}{dt} = 1 \cdot u_1(t) + 3u_2(t) + 4u_3(t).$$

$$\frac{du_3(t)}{dt} = 3u_1(t) + 5u_2(t) + u_3(t)$$



| | |
|----|-----|
| 1 | غ |
| 2 | ب |
| 3 | د |
| 4 | ح |
| 5 | ح |
| 6 | ب |
| 7 | د |
| 8 | ح |
| 9 | ب |
| 10 | د |
| 11 | د |
| 12 | د |
| 13 | الف |
| 14 | ب |
| 15 | ح |
| 16 | د |
| 17 | ب |
| 18 | الف |
| 19 | د |
| 20 | د |



- ماتریس مربع A را پایین هسنبرگی می گویند هرگاه:

$$a_{ij} = 0 \quad , \quad j \geq i + 1 \quad . \cdot 2$$

$$a_{ij} = 0 \quad , \quad j > i + 1 \quad . \cdot 1$$

$$a_{ij} = 0 \quad , \quad i \geq j + 1 \quad . \cdot 4$$

$$a_{ij} = 0 \quad , \quad i > j + 1 \quad . \cdot 3$$

- اگر A یک ماتریس مربعی و وارونپذیر باشد، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

$$tr(A^{-1}) = -tr(A) \quad . \cdot 2$$

$$\det(A^{-1}) = -\det(A) \quad . \cdot 1$$

$$tr(A^k) = (tr(A))^k \quad . \cdot 4$$

$$\det(A^k) = (\det(A))^k \quad . \cdot 3$$

- ماتریسی که از تغییر مکان سطرهای یک ماتریس همانی حاصل شود، چه نام دارد؟

۴. ماتریس متعامد

۳. ماتریس پاد متقارن

۲. ماتریس جایگشت

۱. ماتریس متقارن

- ماتریس A یک ماتریس نامنفرد است اگر...

۲. A یک ماتریس متعامد باشد.

۱. A یک ماتریس متقارن باشد.

۴. A یک ماتریس معین مثبت باشد.

۳. A یک ماتریس قطری غالب باشد.

- اگر A یک ماتریس $n \times n$ باشد، کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

۱. اگر $Ax = b$ آنگاه دستگاه $rank(A|b) = rank(A) = n$ بی نهایت جواب دارد.

۲. اگر $Ax = b$ آنگاه دستگاه $rank(A|b) = rank(A) < n$ جواب یکتا دارد.

۳. اگر $Ax = b$ آنگاه دستگاه $rank(A|b) \neq rank(A)$ جواب ندارد.

۴. اگر $Ax = b$ آنگاه دستگاه $rank(A|b) = rank(A) = n$ جواب ندارد.

- عدد شرطی ماتریس $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ با نرم $\|\cdot\|_\infty$ کدام است؟



۷- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & -1 \\ -2 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ باشد، در این صورت $\|A\|_1$ و $\|A\|_\infty$ به ترتیب برابرند با:

۱. ۸ و ۶

۲. ۱۰ و ۶

۳. ۱۰ و ۸

۴. ۶ و ۸

۸- فرض کنید ماتریس A را به روش تجزیه دولیتل به حاصلضرب LU تجزیه کنیم، در این صورت:

۱. مقادیر قطری ماتریس U را یک انتخاب می کنیم.

۲. مقادیر قطری ماتریس L را صفر انتخاب می کنیم.

۳. مقادیر قطری ماتریس L را یک انتخاب می کنیم.

۹- فرض کنید $P(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$ چندجمله‌ای مشخصه ماتریس $A_{2 \times 2}$ باشد. ماتریس A^{-1} در کدام رابطه صدق می کند؟

$$A^{-1} = \frac{5}{6}I - \frac{1}{6}A \quad .2$$

$$A^{-1} = \frac{5}{6} - \frac{1}{6}A \quad .1$$

$$A^{-1} = A + I \quad .4$$

$$A^{-1} = A - 5I \quad .3$$

۱۰- اگر A یک ماتریس اکیدا قطری غالب باشد، کدام روش برای حل دستگاه $Ax = b$ پایدار بوده و دارای حجم عملیات کمتری است؟

۱. روش حذفی گوس با محورگیری جزی

۲. روش حذفی گوس بدون محورگیری

۳. روش حذفی گوس با محورگیری جزی مقیاس شده

۱۱- فرض کنید L و U به ترتیب بخش‌های پایین مثلثی، قطری و بالا مثلثی ماتریس A باشند. در این صورت ماتریس C در دنباله تکراری حاصل از روش ژاکوبی به صورت $X^{(k)} = BX^{(k-1)} + C$ کدام است؟

$$-(L + D)^{-1}U \quad .4$$

$$-D^{-1}(L + U) \quad .3$$

$$D^{-1}b \quad .2$$

$$(L + D)^{-1}b \quad .1$$

۱۲- اگر $X^{(0)} \in R^n$ و $C \neq 0$ دنباله $X^{(k)} = BX^{(k-1)} + C$ آنگاه به ازای هر انتخاب B جواب دستگاه $AX = b$ همگرا خواهد بود اگر و فقط اگر:

$$\rho(B) < 1 \quad .2$$

$$\|B\| < 1 \quad .1$$

۱. A یک ماتریس اکیدا قطری غالب باشد.

۲. A یک ماتریس معین مثبت باشد.



-۱۳- اگر B_g و B_j به ترتیب ماتریس های تکراری روش ژاکوبی و گاووس سایدل بوده و A یک ماتریس معین مثبت و سه قطری باشد آنگاه، کدام گزینه صحیح است؟

$$\rho(B_g) = \rho(B_j) < 1 \quad .\cdot ۲$$

$$\rho(B_g) = [\rho(B_j)]^2 < 1 \quad .\cdot ۱$$

$$\rho(B_g) = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - [\rho(B_j)]^2}} < 1 \quad .\cdot ۴$$

$$\rho(B_j) = [\rho(B_g)]^2 < 1 \quad .\cdot ۳$$

-۱۴- فرض کنید A یک ماتریس معین مثبت باشد. اگر بخواهیم دنباله حاصل از روش SOR برای هر انتخاب $X^{(0)}$ به جواب دستگاه $AX = b$ همگرا باشد، کدام گزینه می تواند یک انتخاب مناسب برای ω باشد؟

$$\omega = 2.25 \quad .\cdot ۴$$

$$\omega = 0 \quad .\cdot ۳$$

$$\omega = 1 \quad .\cdot ۲$$

$$\omega = 2 \quad .\cdot ۱$$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 10 & 3 & -4 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$ بعد از یک تکرار از روش توانی با انتخاب $X^{(0)} = (1, 1, 1)^T$ ، بزرگترین مقدار ویژه ماتریس A کدام است؟

$$10 \quad .\cdot ۴$$

$$9 \quad .\cdot ۳$$

$$17 \quad .\cdot ۲$$

$$7 \quad .\cdot ۱$$

-۱۶- مجموع و حاصلضرب مقادیر ویژه ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ به ترتیب کدام هستند؟

$$7 \quad .\cdot ۹ \quad .\cdot ۴$$

$$9 \quad .\cdot ۷ \quad .\cdot ۳$$

$$-9 \quad .\cdot ۷ \quad .\cdot ۲$$

$$7 \quad .\cdot ۹ \quad .\cdot ۱$$

-۱۷- اگر تبدیلات گیونز بر روی ماتریس نامتقاضان A اعمال شود، کدام گزینه صحیح است؟

۱. ماتریس A به یک ماتریس سه قطری تبدیل می شود.

۲. ماتریس A به یک ماتریس مثلثی تبدیل می شود.

۳. ماتریس A به یک ماتریس هسنبرگی تبدیل می شود.

۴. ماتریس A به یک ماتریس متعامد تبدیل می شود.



-۱۸ اگر $P(\lambda) = (\lambda + 3)(\lambda - 1)$ کدام است؟ $\det(A^3)$ چندجمله‌ای مشخصه ماتریس $A_{2 \times 2}$ باشد،

-۳ . ۴

۳ . ۳

-۲۷ . ۲

۲۷ . ۱

-۱۹ اگر $\lambda = 3$ و $X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ به ترتیب مقدار ویژه و بردار ویژه نظیر آن برای ماتریس معکوسپذیر $A_{3 \times 3}$ باشند، کدام گزینه

می‌تواند یک مقدار ویژه و بردار ویژه نظیر آن برای ماتریس A^{-1} باشد؟

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ و } \lambda = 3$$

.۲

$$X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ و } \lambda = 3$$

.۱

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ و } \lambda = \frac{1}{3}$$

.۴

$$X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ و } \lambda = \frac{1}{3}$$

.۳

-۲۰ اگر λ_1 و λ_2 مقادیر ویژه ماتریس ضرایب دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول با ضرایب ثابت

$$\begin{cases} u'(t) = a_1u(t) + a_2v(t) \\ v'(t) = b_1u(t) + b_2v(t) \end{cases}$$

جواب این دستگاه معادلات دیفرانسیل باشد؟

$e^{\lambda_1 t} V_2$

$e^{\lambda_1 t} V_2 + e^{\lambda_2 t} V_1$

$e^{\lambda_2 t} V_1$

$e^{\lambda_1 t} V_1$

سوالات تشریحی

۱۴۰ نمره

- ثابت کنید مقادیر ویژه ماتریسهای هرمیتی، حقیقی هستند.

نمره ۱،۴۰

- دستگاه معادلات زیر را با استفاده از روش تجزیه چولسکی حل کنید.

$$2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = -4$$

$$x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 10$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5$$

نمره ۱،۴۰

- دو تکرار از روش SOR را با انتخاب $\omega = 1.25$ و بردار اولیه $X^{(0)} = (1, 1, 1)^T$ برای یافتن جواب دستگاه معادلات زیر بدست آورید.

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 = 24 \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 30 \\ -x_2 + 4x_3 = -24 \end{cases}$$

نمره ۱،۴۰

- اگر $tr(A^4) = 6992$ و $tr(A^3) = 712$ ، $tr(A^2) = 96$ ، $tr(A) = 4$ باشند، به روش لورییر چندجمله‌ای مشخصه ماتریس $A_{4 \times 4}$ را بیابید.

نمره ۱،۴۰

- جواب معادله دیفرانسیل با شرایط مرزی زیر را به ازای $h = 0.2$ بیابید. (حل دستگاه نهایی لازم نیست)

$$\begin{cases} y'' + 4y' + xy = e^x, & 0 \leq x \leq 1, \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

| سوال | جواب | سوال |
|------|------|------|
| 26 | الف | 1 |
| 27 | ج | 2 |
| 28 | ب | 3 |
| 29 | د | 4 |
| 30 | ج | 5 |
| 31 | ب | 6 |
| 32 | الف | 7 |
| 33 | الف | 8 |
| 34 | ب | 9 |
| 35 | ج | 10 |
| 36 | ب | 11 |
| 37 | ب | 12 |
| 38 | الف | 13 |
| 39 | ب | 14 |
| 40 | د | 15 |
| 41 | د | 16 |
| 42 | ج | 17 |
| 43 | ب | 18 |
| 44 | ج | 19 |
| 45 | الف | 20 |
| 46 | | 21 |
| 47 | | 22 |
| 48 | | 23 |
| 49 | | 24 |
| 50 | | 25 |





-۱ کدامیک از ماتریس‌های زیر پایین هستبرگی نمی‌باشد؟ (به از اهر $a_i \in R$ و $a_i \neq 0$)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \circ \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \circ \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} .\text{۲}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \circ \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} .\text{۱}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \circ \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} .\text{۴}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \circ \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} .\text{۳}$$

-۲ کدام است؟ $A^* \cdot A = \begin{bmatrix} 3+2i & 4-5i \\ -6i & 9+i\sqrt{2} \\ 7-i & 6+7i \end{bmatrix}$ اگر

$$\begin{bmatrix} 3-2i & 6i \\ 6i & 9-i\sqrt{2} \\ 7+i & 6-7i \end{bmatrix} .\text{۲}$$

$$\begin{bmatrix} 3-2i & 6i & 7+i \\ 4+5i & 9-i\sqrt{2} & 6-7i \end{bmatrix} .\text{۱}$$

$$\begin{bmatrix} 3-2i & 4i \\ 6i & 9-i\sqrt{2} \\ 7+i & 6+7i \end{bmatrix} .\text{۴}$$

$$\begin{bmatrix} 3+2i & -6i & 7-i \\ 4-5i & 9+i\sqrt{2} & 6+7i \end{bmatrix} .\text{۳}$$



-۳ کدام گزینه صحیح است؟

۱. اگر $A_{n \times n}$ دارای دو سطر قرینه یکدیگر باشند انگاه: $\det(A) = 0$

۲. اگر k برابر سطر n ام $A_{n \times n}$ را به سطر اول $A_{n \times n}$ اضافه کنیم انگاه: دترمینان ماتریس حاصل $\frac{1}{k} \det(A)$ برابر دترمینان ماتریس اولیه است.

۳. اگر سطر n ام $A_{n \times n}$ در k ضرب شود انگاه: دترمینان ماتریس حاصل $k^n \det(A)$ برابر دترمینان ماتریس اولیه است.

۴. اگر به سطر n ام $A_{n \times n}$ عدد k اضافه شود انگاه: دترمینان ماتریس حاصل k مرتبه بیشتر از دترمینان ماتریس اولیه است.

۴- با فرض $\text{rank}(A) = 3$ برای $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 6 & 3 & 12 \end{bmatrix}$

۴.۴

۳.۳

۲.۲

۱.۱

۵- مقادیر ویژه ماتریس $A = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 10 & 4 \end{bmatrix}$ کدام است؟

± ۲ . ۴

± ۲i . ۳

-۲ و -2i . ۲

2i . ۱

۶- با فرض $\|x\|_\infty = 1$ ، $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ کدام است؟

 $\sqrt{14}$. ۴

۶.۳

۳.۲

۲.۱

۷- اگر $A^2 + A + I = 0$ ؛ وارون A^{-1} کدام است؟

-($A + I$) . ۴($A^T + I$) . ۳-($A^T + I$) . ۲ $A + I$. ۱



-۸ با فرض L پایین مثلثی اکید، D قطری اکید، U بالا مثلثی اکید است. برای حل دستگاه $A = L + D + U$ در روش گوس-سایدل کدام است؟

$$X^{(k)} = (L + D)^{-1} U X^{(k-1)} + (L + D)^{-1} b \quad .۱$$

$$X^{(k)} = -(L + D)^{-1} U X^{(k-1)} + (L + D)^{-1} b \quad .۲$$

$$X^{(k)} = D^{-1} (L + U) X^{(k-1)} + D^{-1} b \quad .۳$$

$$X^{(k)} = -D^{-1} (L + U) X^{(k-1)} + D^{-1} b \quad .۴$$

-۹ اگر $X^{(0)} \in R^n$ انگاه به ازا هر انتخاب $C \neq 0$ ، $X^{(k)} = C + BX^{(k-1)}$ دستگاه $AX = b$ همگراست اگر و فقط اگر دستگاه $AX = b$

$$\rho(B) < 1 \quad .۱ \quad \rho(A) < 1 \quad .۲$$

$$\rho(A) \text{ موجود است} \quad .۳ \quad \rho(B) \text{ موجود است} \quad .۴$$

-۱۰ کدام گزینه صحیح است؟

$$(I + B)^{-1} = \sum_{i=0}^{\infty} B^i \quad \text{اگر} \quad \rho(B) < 1 \quad .۱$$

$$(I - B)^{-1} = \sum_{i=0}^{\infty} B^i \quad \text{اگر} \quad \rho(B) < 1 \quad .۲$$

$$(I + B)^{-1} = \sum_{i=0}^{\infty} B^i \quad \text{اگر} \quad \rho(B) > 1 \quad .۳$$

$$(I - B)^{-1} = \sum_{i=0}^{\infty} B^i \quad \text{اگر} \quad \rho(B) > 1 \quad .۴$$



-۱۱ برای $A_{n \times n}$ سرعت همگرایی روش توانی :

$$\left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right| < 1 \quad \text{بستگی دارد به}$$

$$\left| \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right| < 1 \quad \text{بستگی دارد به}$$

$$\left| \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right|^n < 1 \quad \text{بستگی دارد به}$$

$$\left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|^n < 1 \quad \text{بستگی دارد به}$$

$$\begin{cases} 10x_1 + 3x_2 + x_3 = 14 \\ 2x_1 - 10x_2 + 3x_3 = -5 \\ x_1 + 3x_2 + 10x_3 = 14 \end{cases} \quad -۱۲$$

فرض کنید کدام گزاره صحیح است؟

۱. دنباله $(X^{(k)})$ از روش ژاکوبی به ازا هر انتخاب اولیه $X^{(0)} \in R^{(n)}$ به جواب دستگاه مفروض همگراست، اما همگرایی دنباله $(X^{(k)})$ از روش گوس - سایدل به نقطه اولیه $X^{(0)} \in R^{(n)}$ وابسته است.

۲. دنباله $(X^{(k)})$ از روش گوس - سایدل به ازا هر انتخاب اولیه $X^{(0)} \in R^{(n)}$ به جواب دستگاه مفروض همگراست، اما همگرایی دنباله $(X^{(k)})$ از روش ژاکوبی به نقطه اولیه $X^{(0)} \in R^{(n)}$ وابسته است.

۳. دنباله $(X^{(k)})$ از روش ژاکوبی و گوس - سایدل به ازا هر انتخاب اولیه $X^{(0)} \in R^{(n)}$ به جواب دستگاه مفروض همگراست.

۴. همگرایی دنباله $(X^{(k)})$ از روش ژاکوبی و گوس - سایدل به نقطه اولیه $X^{(0)} \in R^{(n)}$ وابسته است.

$$\text{عدد شرطی ماتریس } \left[\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{array} \right] \text{ را با نرم } \|\cdot\|_\infty \text{ بیابید.} \quad -۱۳$$

۹ . ۴

۵ . ۳

۲ . ۲

۱ . ۱

-۱۴ کدام گزینه صحیح است؟

۱. اگر A یک ماتریس حقیقی باشد انگاه مقادیر ویژه A صفر یا موهومی اند.

۲. اگر A یک ماتریس حقیقی باشد انگاه دارای حداقل یک مقدار ویژه حقیقی محض است.

۳. اگر A یک ماتریس حقیقی باشد انگاه دارای حداقل یک مقدار ویژه موهومی محض است.

۴. اگر A یک ماتریس حقیقی باشد و α یک مقدار ویژه ان باشد انگاه $\bar{\alpha}$ نیز مقدار ویژه A است.



۱۵- فرض کنید A معکوس پذیر است.

اگر λ مقدار ویژه A و X بردار ویژه نظیر آن باشد. کدام گزینه صحیح است؟

۱. $\frac{1}{X}$ مقدار ویژه A^{-1} و $\frac{1}{\lambda}$ بردار ویژه نظیر آن باشد

۲. a مقدار ویژه A^{-1} و X بردار ویژه نظیر آن باشد

۳. $\frac{1}{a}$ مقدار ویژه A^{-1} و X بردار ویژه نظیر آن باشد

۴. $\frac{1}{a}$ مقدار ویژه A^{-1} و $\frac{1}{X}$ بردار ویژه نظیر آن باشد

۱۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱. مقادیر ویژه ماتریس مقدماتی ± 1 است.

۲. مقادیر ویژه ماتریس متعامد حقیقی و مثبت است.

۳. مقادیر ویژه ماتریس متعامد حقیقی و مثبت است.

۱۷- کدام گزاره صحیح است؟

۱. اگر A ماتریسی مربعی با مقادیر ویژه متمایز باشد انگاه A با یک ماتریس قطری متشابه است.

۲. اگر A ماتریسی مربعی با مقادیر ویژه متمایز باشد انگاه A با یک ماتریس متعامد است.

۳. اگر A ماتریسی مربعی با مقادیر ویژه متمایز باشد انگاه A با یک ماتریس متقارن است.

۴. اگر A ماتریسی مربعی با مقادیر ویژه متمایز باشد انگاه A با یک ماتریس متمایز است.



۱۸- قضیه گوشگورین کدام است؟

.۱
 $A_{n \times n}$ باشد آنگاه مقادیر ویژه $i = 1, 2, \dots, n$ برای $r_i = \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ دایره ای به مرکز a_{ii} و شعاع C_i و $A_{n \times n}$ اگر در $\bigcup_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n C_i$ قرار دارند.

.۲
 $A_{n \times n}$ باشد آنگاه مقادیر ویژه $i = 1, 2, \dots, n$ برای $r_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$ دایره ای به مرکز a_{ii} و شعاع C_i و $A_{n \times n}$ اگر در $\bigcup_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n C_i$ قرار دارند.

.۳
 $A_{n \times n}$ باشد آنگاه مقادیر ویژه $i = 1, 2, \dots, n$ برای $r_i = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ دایره ای به مرکز a_{ii} و شعاع C_i و $A_{n \times n}$ اگر در $\bigcup_{i=1}^n C_i$ قرار دارند.

.۴
 $A_{n \times n}$ باشد آنگاه مقادیر ویژه $i = 1, 2, \dots, n$ برای $r_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$ دایره ای به مرکز a_{ii} و شعاع C_i و $A_{n \times n}$ اگر در $\bigcup_{i=1}^n C_i$ قرار دارند.

-۱۹
 با فرض $\|A\|_p ; A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ کدام است؟

۵ . ۴

۳ . ۳

۲ . ۲

- 2 . 1



-۱۰ هر گاه $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ باشد و $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ صفرهای چند جمله‌ای

$$\text{انگاه: } S_k = \alpha_1^k + \dots + \alpha_n^k$$

$$s_k + a_1s_{k-1} + \dots + a_{k-1}s_1 + ka_k = 0 \quad k=1, 2, \dots, n \quad .1$$

$$s_k^n + a_1s_{k-1}^{n-1} + \dots + a_{k-1}s_1 + ka_k = 0 \quad k=1, 2, \dots, n \quad .2$$

$$s_k^k + a_1s_{k-1}^{k-1} + \dots + a_{k-1}s_1 + ka_k = 0 \quad k=1, 2, \dots, n \quad .3$$

$$s_k^n + a_1s_{k-1}^{n-1} + \dots + a_{k-1}s_k + ka_k = 0 \quad k=1, 2, \dots, n \quad .4$$

سوالات تشریحی

۱۰ نمره

$$\rho(A) \leq \|A\| \quad .1$$

۱۰ نمره

-۱۱ اگر A ماتریس ضرایب و E ماتریس خطای ضرایب و X_t جواب واقعی و X_e جواب محاسبه شده

$$\text{دستگاه } A X = b \quad \text{انگاه: } C(A) \frac{\|E\|}{\|A\|} \geq \frac{\|X_t - X_e\|}{\|X_e\|}$$

۱۰ نمره

$$\begin{cases} pX_1 + X_2 = 1 \\ X_1 + pX_2 + X_3 = 2 \\ X_2 + pX_3 = 3 \end{cases} \quad .3$$

نشان دهید روش گوس-سایدل برای دستگاه اولیه همگرای است

در صورتیکه، $p > \sqrt{2}$

۱۰ نمره

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{matrix} \quad .4$$

چند جمله‌ای مشخصه

به روش ضرایب نامعین محاسبه کنید.

نمره ۱،۴۰

-۵

را محاسبه کنید.

$$\begin{cases} \frac{d u(t)}{dt} = \mu u(t) + \nu v(t) \\ \frac{d v(t)}{dt} = -\mu u(t) - \nu v(t) \end{cases}$$

جواب عمومی دستگاه معادلات دیفرانسیل



- ماتریس مربعی A پایین هسنبرگی است اگر ...

$$a_{ij} = 0, \quad i < j - 1 \quad .2$$

$$a_{ij} = 0, \quad i < j + 1 \quad .1$$

$$a_{ij} = 0, \quad i > j + 1 \quad .4$$

$$a_{ij} = 0, \quad i \neq j \quad .3$$

- کدام گزینه صحیح است؟

۱. دو بردار متمایز دارای نرم متمایز هستند.

۲. نرم یک بردار غیر صفر همواره غیر صفر است.

۳. اگر A یک ماتریس و X یک بردار باشد آنگاه $\|AX\| \leq \|A\| \|X\|$

۴. رابطه $\|A\| = \max_{i,j} |a_{ij}|$ یک نرم ماتریسی است.

- کدام گزینه برای دترمینان ماتریس $A_{n \times n}$ صحیح است؟

۱. اگر یک سطر A با یک ستون آن برابر باشد در این صورت $\det(A) = 0$

$$\det(A) = \det(A^t) \quad .2$$

$$\det(A) = \det(A^k), \quad k \in \mathbb{N} \quad .3$$

$$\det(A) = \det(A^{-1}) \quad .4$$

- اگر A یک ماتریس $n \times n$ باشد، آنگاه برای جواب دستگاه $AX = b$ کدام گزینه صحیح است؟

۲. دستگاه بینهایت جواب دارد.

۱. دستگاه فاقد جواب است.

۴. دستگاه دو جواب دارد.

۳. دستگاه جواب منحصر بفرد دارد.

- کدامیک از تعاریف زیر نمی تواند یک نرم ماتریسی باشد؟

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}| \quad .4$$

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad .3$$

$$\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \quad .2$$

$$\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad .1$$



-۶ در روش‌های گاوس و گاوس جردن ، ماتریس ضرایب دستگاه معادلات $AX = b$ به ترتیب (از راست به چپ) تبدیل به چه ماتریس‌هایی می‌شوند؟

- ۲. بالا مثلثی - قطری
- ۴. قطری - پایین مثلثی
- ۳. مثلثی - قطری

-۷ خطای نسبی جواب محاسبه شده دستگاه $AX = b$ به کدام گزینه بستگی دارد؟

- ۲. دترمینان ماتریس A
- ۴. مقادیر ویژه ماتریس A
- ۱. نرم بردار $A^{-1}b$
- ۳. عدد شرطی ماتریس A

-۸ در تجزیه دولیتل ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ مولفه‌های l_{21} و u_{23} به ترتیب کدامند؟

$$\text{۱. } \frac{1}{2} \text{ و } \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{۲. } 2\sqrt{3} \text{ و } \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{۳. } 1 \text{ و } 2$$

-۹ ماتریس روش ژاکوبی برای تعیین جواب دستگاه $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - \frac{1}{2}x_3 = 6 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 + 2x_3 = 2 \end{cases}$ کدام است؟

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccc} 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{ccc} 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{ccc} 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{6} & -\frac{7}{24} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{12} \end{array} \right] & \left[\begin{array}{ccc} 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & -\frac{1}{6} & \frac{7}{24} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{12} \end{array} \right] \end{array} \quad .1 \quad .2 \quad .3 \quad .4$$



-۱۰- روش تصحیح باقیمانده روشی است که ...

۱. خطای جواب تقریبی دستگاه را با یک دنباله نا متناهی به صفر نزدیک می کند.
۲. خطای جواب تقریبی را تخمین می زند.
۳. نیاز به تقریب اولیه جواب ندارد.
۴. فقط در روش‌های تکراری به کار می رود.

-۱۱- اگر A یک ماتریس تنک با ابعاد بزرگ باشد کدامیک از روش‌های زیر برای حل دستگاه $AX = b$ مناسبتر است؟

۱. روش SOR
۲. روش حذفی گوس با محورگیری جزیی
۳. روش حذفی گوس با محورگیری کلی
۴. روش تجزیه چولسکی

-۱۲- دومین تقریب جواب دستگاه زیر به روش گاووس- سایدل و با فرض $X^{(0)} = (0,0,0)$ کدام است؟

$$\begin{cases} 10x_1 - 2x_2 - x_3 = 3 \\ -x_1 + 5x_2 - x_3 = 6 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

$$X^{(2)} = (0.69, 1.56, 2.25) \quad .\cdot 2 \qquad X^{(2)} = (0.69, 1.26, 2.28) \quad .\cdot 1$$

$$X^{(2)} = (0.3, 1.26, 2.28) \quad .\cdot 4 \qquad X^{(2)} = (0.78, 1.812, 2.796) \quad .\cdot 3$$

-۱۳- سرعت همگرایی روش تکراری $X^{(n+1)} = BX^{(n)} + C$ برای حل دستگاه $AX = b$ به کدامیک از موارد زیر بستگی دارد؟

۱. مقادیر ویژه ماتریس C
۲. مقادیر ویژه ماتریس B
۳. وارون پذیری ماتریس $I - B$
۴. مقادیر ویژه ماتریس A

-۱۴- اگر رابطه $A^2 - 5A = -6I$ برقرار باشد، مقادیر ویژه A کدامند؟

$$0,5 \quad .\cdot 4 \qquad 2 \pm i \quad .\cdot 3 \qquad 2,3 \quad .\cdot 2 \qquad -2,-3 \quad .\cdot 1$$

-۱۵- هرگاه $\lambda = 1$ مقدار ویژه ماتریس A باشد گزینه همواره درست است؟

$$\lambda = 1 \quad .\cdot 2 \qquad \text{مقدار ویژه } A^2 \text{ است.} \quad \lambda = 1 \quad .\cdot 1$$

$$\lambda = -1 \quad .\cdot 3 \qquad \text{نیز مقدار ویژه } A \text{ است.} \quad \lambda = 1 \quad .\cdot 4 \qquad \text{هیچکدام از مقادیر ویژه } A \text{ صفر نیستند.}$$



۱۶- کدامیک از موارد زیر درباره مقادیر ویژه ماتریس هرمیتی درست است؟

- ۱. دو به دو معکوس یکدیگرند.
- ۲. ناصرفند.
- ۳. موهومی محض هستند.
- ۴. حقیقی هستند.

۱۷- کدامیک جز دایر گرشگورین برای ماتریس زیر است؟

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| $\{z \in c : z - 1 \leq 2\}$ | ۱ | $\{z \in c : z - 1 \leq 5\}$ |
| $\{z \in c : z - 1 \leq 10\}$ | ۲ | $\{z \in c : z - 9 \leq 2\}$ |

۱۸- اگر $P(\lambda) = (\lambda^2 - 1)(\lambda + 3)$ چندجمله‌ای مشخصه ماتریس A باشد، چندجمله‌ای مشخصه ماتریس $A + I$ کدام است؟

۱. $\lambda^3 + 6\lambda^2 + 8\lambda$ ۲. $\lambda^3 + 3\lambda^2 - \lambda - 3$ ۳. $\lambda^3 - 4\lambda$ ۴. $\lambda^3 - 4\lambda + 4$

۱۹- اگر ماتریس A یک ماتریس نامنفرد باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- ۱. تجزیه $A = QR$ منحصر به فرد است.
- ۲. تجزیه $A = LU$ منحصر به فرد است.
- ۳. ماتریس A معین مثبت است.
- ۴. ماتریس A اکیدا قطری غالب است.

۲۰- تعیین نزدیکترین مقدار ویژه ماتریس A به عدد p با کدام گزینه معادل است؟

- ۱. تعیین بزرگترین مقدار ویژه ماتریس $A - pI$ از نظر قدرمطلق به روش توانی و جمع آن با p .
- ۲. تعیین کوچکترین مقدار ویژه ماتریس $A - pI$ از نظر قدرمطلق به روش معکوس توانی و جمع آن با p .
- ۳. تعیین بزرگترین مقدار ویژه ماتریس $A + pI$ از نظر قدرمطلق به روش توانی و جمع آن با p .
- ۴. تعیین کوچکترین مقدار ویژه ماتریس $A + pI$ از نظر قدرمطلق به روش معکوس توانی و جمع آن با p .



-۲۱- در روش توان ماتریسی برای تسریع همگرایی روش توانی، چرا باید k فرد باشد؟

۱. در صورت زوج بودن k ، λ را نمی‌توان با استفاده از λ^k بدست آورد.
۲. در صورت زوج بودن k ، محاسبات پیچیده تر می‌شود.
۳. در صورت زوج بودن k ، انتشار خطابی بیشتر است.
۴. در صورت زوج بودن k ، همگرایی روش توانی افزایش نمی‌یابد..

-۲۲- هرگاه بزرگترین مقدار ویژه ماتریس A (از نظر قدر مطلق) برابر با ۱۱ و بردار ویژه نظیر آن برابر با

$$\text{باشد، ماتریس تقلیل یافته در توسعی روش توانی کدام است؟} \quad X^{(1)} = (0.5, 1, 0.75)^t$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 10 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ -4.5 & -2 \end{bmatrix} \cdot 4$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4.5 & 2 \end{bmatrix} \cdot 3$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -4.5 & -2 \end{bmatrix} \cdot 2$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 \\ -4.5 & 2 \end{bmatrix} \cdot 1$$

-۲۳- کدامیک از روش‌های زیر یک روش تبدیلی برای تعیین مقادیر ویژه ماتریس A است؟

۱. روش QR

۲. روش LR

۳. روش گاووس

۴. روش گیونز

-۲۴-

برای تعیین چند جمله‌ای مشخصه ماتریس سه قطری متقارن به روش بازگشتی و فرض

$$A = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 \\ c_1 & b_2 & c_2 & 0 \\ 0 & c_2 & b_3 & c_3 \\ 0 & 0 & c_3 & b_4 \end{bmatrix}$$

کدام است؟ $f_2(\lambda) = (\lambda - b_1)(\lambda - b_2)$ و $f_0(\lambda) = 1$

$$\lambda^2 - (b_1 + b_2)\lambda - c_1^2 \cdot 2$$

$$\lambda^2 - (b_1 + b_2)\lambda + b_1 b_2 - c_1^2 \cdot 1$$

$$\lambda^2 - (b_1 - b_2)\lambda - c_1^2 \cdot 4$$

$$(\lambda - b_1)(\lambda - b_2) \cdot 3$$



- ۴۵- روش تفاضلات متناهی برای حل یک معادله با مشتقهای جزئی، آن را به ... تبدیل می کند.

۱. دستگاه معادلات خطی
۲. معادله دیفرانسیل معمولی
۳. مسئله مقدار ویژه ماتریسی
۴. معادله مثلثاتی

سوالات تشریحی

۱.۷۵ نمره

- الف) نشان دهید عناصر قطری یک ماتریس پادمتریان صفرند.

ب) نشان دهید اگر ماتریس مربعی A رتبه کامل باشد ماتریس $A^T A$ معین مثبت است.

۱.۷۵ نمره

- ۴- دستگاه معادلات زیر را به روش تجزیه چولسکی حل کنید.

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = -4 \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 10 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

۱.۷۵ نمره

- ۳- نشان دهید بردارهای ویژه نظیر مقادیر ویژه متمایز یک ماتریس هرمیتی، متعامدند.

۱.۷۵ نمره

- ۴- معادله دیفرانسیل مقدار مرزی زیر را با انتخاب $h = 0.2$ حل کنید (حل دستگاه معادلات لازم نیست):

$$y'' + 4y' + xy = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

$$y(0) = 0,$$

$$y(1) = 0.$$



-۱ هرگاه ماتریس A در رابطه $A^3 + 2A^2 + 5A + I = O$ صدق کند، وارون A کدام است؟

$$A^{-1} = -(A^2 + 2A + 5I) \quad .\cdot 2$$

.۴. ماتریس A وارون پذیر نیست.

$$A^{-1} = A^2 + 2A + 5I \quad .\cdot 1$$

$$A^{-1} = -(A^3 + 2A^2 + 5A) \quad .\cdot 3$$

-۲ هرگاه A یک ماتریس پاد متقارن باشد، به ازای هر بردار دلخواه X ، حاصل X^TAX کدام است؟

.۴. مشخص نیست.

.۳. منفی

.۲. مثبت

.۱. صفر

$$A = \begin{bmatrix} \circ & 1+i \\ 1-i & \circ \end{bmatrix} \quad .\cdot 3$$

نوع ماتریس
کدام است؟

.۴. یکانی

.۳. هرمیتی

.۲. متقارن

.۱. پاد متقارن

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \circ & \circ & \circ \\ -3 & -5 & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & -1 & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & 2 & 3 \\ \circ & \circ & \circ & 5 & 7 \end{bmatrix} \quad .\cdot 4$$

وارون ماتریس
کدام است؟

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & \circ & \circ & \circ \\ -3 & 1 & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & 1 & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & 2 & -3 \\ \circ & \circ & \circ & 5 & -7 \end{bmatrix} \quad .\cdot 2$$

$$\begin{bmatrix} -5 & -2 & \circ & \circ & \circ \\ 3 & 1 & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & -1 & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & -7 & 3 \\ \circ & \circ & \circ & 5 & -2 \end{bmatrix} \quad .\cdot 1$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & \circ & \circ & \circ \\ -5 & -3 & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & -1 & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & 3 & 2 \\ \circ & \circ & \circ & -7 & -5 \end{bmatrix} \quad .\cdot 4$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & \circ & \circ & \circ \\ 3 & -5 & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & 1 & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & -2 & -3 \\ \circ & \circ & \circ & 5 & 7 \end{bmatrix} \quad .\cdot 3$$



۱ . ۴

 $\sqrt[3]{34}$. ۳

۵ . ۲

۶ . ۱

$$\text{باشد، حاصل } \|A\|_{\infty} - \|A\|_1 \text{ کدام است؟} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -2 \\ -3 & 0 & -3 & 1 \\ 2 & -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{اگر هرگاه}$$

۱ . ۴

-۱ . ۳

۳ . ۲

-۳ . ۱

$$\text{باشد، عدد شرطی } A \text{ با نرم ستونی (}\|A\|_1\text{) کدام است؟} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{هرگاه}$$

۲ . ۴

۷ . ۳

۳ . ۲

۳۵ . ۱

-۸ در تجزیه LU ماتریس A ، اگر درایه های قطری ماتریس U برابر یک انتخاب شوند، این تجزیه چه نامیده می شود؟

۴ . تجزیه QR

۳ . تجزیه کروت

۲ . تجزیه دولیتل

۱ . تجزیه چولسکی

-۹ در حل دستگاه $AX = b$ به روش حذفی گاووس در چه صورت تعویض جای سطر و ستون ها لازم نیست؟

۲ . ماتریس متقارن باشد.

۱ . ماتریس منفرد باشد.

۴ . ماتریس پایین مثلثی باشد.

۳ . ماتریس معین مثبت باشد.

-۱۰ در دستگاه زیر مقدار B_j که در آن ماتریس روش تکراری ژاکوبی است، کدام است؟

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 + 8x_3 = 16 \\ x_1 + 10x_2 + 2x_3 = 16 \\ 2x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 51 \end{cases}$$

۰/۵ . ۴

۰/۸ . ۳

۱ . ۲

۰/۹ . ۱



-11

اگر دستگاه سؤال ۱۰ را به روش ژاکوبی با $X^{(3)} = \begin{bmatrix} \circ \\ \circ \\ \circ \end{bmatrix}$ حل کنیم، مقدار کدام است؟

$$\begin{bmatrix} -2.210 \\ 0.825 \\ 7.23 \end{bmatrix} .4$$

$$\begin{bmatrix} -2.64 \\ 0.42 \\ 4.46 \end{bmatrix} .3$$

$$\begin{bmatrix} -2.01 \\ 0.972 \\ 5.544 \end{bmatrix} .2$$

$$\begin{bmatrix} 1.6 \\ 1.6 \\ 5.1 \end{bmatrix} .1$$

-12

اگر دستگاه سؤال ۱۰ را به روش تکراری گاوس سایدل با $X^{(2)} = \begin{bmatrix} \circ \\ \circ \\ \circ \end{bmatrix}$ حل کنیم، مقدار کدام است؟

$$\begin{bmatrix} -2.1376 \\ 0.91536 \\ 5.3444 \end{bmatrix} .4$$

$$\begin{bmatrix} 1.6 \\ 1.44 \\ 4.492 \end{bmatrix} .3$$

$$\begin{bmatrix} -2.1376 \\ 1.91536 \\ 5.9944 \end{bmatrix} .2$$

$$\begin{bmatrix} 2.575 \\ 1.1231 \\ 5.796 \end{bmatrix} .1$$

-13

اگر در حل دستگاه $AX = b$ به روش گاوس سایدل بزرگترین و کوچکترین مقدار ویژه B_g به ترتیب برابر ۴ و باشند، بهترین انتخاب ω برای روش SOR کدام است؟

$$.0/625 .4$$

$$1/76 .3$$

$$1/21 .2$$

$$2/0.83 .1$$

-14

اگر $\|A\|_2$ باشد، کدام است؟

$$5 .4$$

$$\sqrt{10} .3$$

$$20 .2$$

$$2\sqrt{5} .1$$

-15 - روش معکوس توانی روشی برای تقریب...

۱. بزرگترین مقدار ویژه ماتریس A می باشد.

۲. کوچکترین مقدار ویژه ماتریس A^{-1} می باشد.

۳. کوچکترین مقدار ویژه ماتریس A از نظر قدر مطلق می باشد.

۴. دومین مقدار ویژه ماتریس A از نظر قدر مطلق می باشد.



-۱۶- اگر A یک ماتریس مربعی باشد، کدام یک از عبارت های زیر درست است؟

$$\rho(A) < \|A\|_{\infty} \quad .\cdot 2$$

$$\|A\|_1 < \rho(A) < \|A\|_{\infty} \quad .\cdot 1$$

$$\rho(A) \leq \min\{\|A\|_1, \|A\|_{\infty}\} \quad .\cdot 4$$

$$\rho(A) < \|A\|_1 \quad .\cdot 3$$

-۱۷- هرگاه روش تکرار توانی را برای تقریب مقدار ویژه غالب $X^{(0)}$ به کار گیریم، با بردار اولیه $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 11 & -5 \\ 1 & -2 & 17 & -7 \\ 1 & -4 & 26 & -10 \end{bmatrix}$ به کار اولیه

دومین تقریب λ_1 کدام است؟

$$\frac{9}{2} \quad .\cdot 4$$

$$\frac{16}{3} \quad .\cdot 3$$

$$9 \quad .\cdot 2$$

$$12 \quad .\cdot 1$$

-۱۸- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ باشد $\|A\|_p$ کدام است؟

$$2 \quad .\cdot 4$$

$$\sqrt{5} \quad .\cdot 3$$

$$1 \quad .\cdot 2$$

$$5 \quad .\cdot 1$$

-۱۹- هرگاه روش ژاکوبی را برای قطری کردن ماتریس $A = \begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix}$ به کار ببریم، در اولین تکرار بری صفر کردن

درایه ماکزیمم، مقدار θ چقدر محاسبه می شود؟

$$-0.5272 \quad .\cdot 4$$

$$0.5272 \quad .\cdot 3$$

$$\frac{\pi}{4} \quad .\cdot 2$$

$$\frac{\pi}{2} \quad .\cdot 1$$



-۴۰ اگر بخواهیم $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 5 \\ 4 & 5 & -1 \end{bmatrix}$ را به روش هاووس هلدر سه قطری کنیم، بردار V_2 کدام است؟

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} .4$$

$$\begin{bmatrix} \circ \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} .3$$

$$\begin{bmatrix} \circ \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} .2$$

$$\begin{bmatrix} \circ \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} .1$$

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

-۱ اگر A یک ماتریس ناصفر باشد، نشان دهید $tr(AA^t) > 0$.

ب) نشان دهید رابطه $\|A\| = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|$ نمی تواند یک نرم ماتریسی تعریف کنید.

نمره ۱،۴۰

-۲ نشان دهید $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & \circ \\ 3 & 4 & -1 \\ \circ & -1 & 4 \end{bmatrix}$ یک ماتریس معین مثبت است. سپس به روش چولسکی آن را به صورت LL^t تجزیه کنید، که در آن L ماتریس پایین مثلثی است.

نمره ۱،۴۰

-۳ قضیه: فرض کنید λ یک مقدار ویژه A و X بردار ویژه A^{-1} موجود باشد، ثابت کنید مقدار ویژه A^{-1} و X بردار ویژه نظیر آن است.

نمره ۱،۴۰

-۴ چند جمله ای مشخصه ماتریس سه قطری متقارن $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ را بدست آورید.

نمره ۱،۴۰

-۵ معادله دیفرانسیل با مقدار مرزی زیر را به ازای $h = 0.2$ حل کنید. (حل دستگاه نهایی لازم نیست).

$$y'' + (\sin x)y' - (\cos x)y = \ln x \quad 1 \leq x \leq 2$$

$$y(1) = 1$$

$$y(2) = 0$$



شماره سوال

| | |
|----|-----|
| 1 | ب |
| 2 | الف |
| 3 | ج |
| 4 | الف |
| 5 | الف |
| 6 | د |
| 7 | ج |
| 8 | ج |
| 9 | ج |
| 10 | الف |
| 11 | ب |
| 12 | د |
| 13 | ب |
| 14 | الف |
| 15 | ج |
| 16 | د |
| 17 | ج |
| 18 | الف |
| 19 | ب |
| 20 | ب |



- تعريف ماترييس پايان مثلثي کدام است؟

$$i > j \text{ برای } a_{ij} = 0 \quad .\cdot ۲$$

$$i < j \text{ برای } a_{ij} = 0 \quad .\cdot ۱$$

$$i \neq j \text{ برای } a_{ij} = 0 \quad .\cdot ۴$$

$$i = j \text{ برای } a_{ij} = 0 \quad .\cdot ۳$$

- کدامیک از ماتریسهای زیر هرمیتی است؟

$$\begin{bmatrix} 1 & i \\ 2+i & 0 \end{bmatrix} \quad .\cdot ۴$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 7+8i \\ 7-8i & 4i \end{bmatrix} \quad .\cdot ۳$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 7+8i \\ 7+8i & 4 \end{bmatrix} \quad .\cdot ۲$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 7+8i \\ 7-8i & 4 \end{bmatrix} \quad .\cdot ۱$$

- هرگاه $X = (5, 2, -1)$ در این صورت $\|X\|_\infty$ کدام است؟

$$\sqrt{30} \quad .\cdot ۴$$

$$6 \quad .\cdot ۳$$

$$5 \quad .\cdot ۲$$

$$8 \quad .\cdot ۱$$

- کدامیک جز اعمال سطري مقدماتی نیست؟

۱. تعویض جای دو سطر

۱. ضرب یک سطر ماتریس در یک عدد ناصلر

۴. حذف یک سطر

۳. جمع کردن مضربی از یک سطر با سطری دیگر

- هدف از انجام محور گیری جزئی در روش حذفی گاوس چیست؟

۲. تبدیل آن به یک دستگاه مثلثی

۱. حل دستگاه معادلات

۴. کاهش حجم محاسبات

۳. کاهش خطای محاسبات

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad .\cdot ۶$$

را به روش دولیتل به صورت LU تجزیه کنیم، مولفه سطر ۲ و ستون ۱ ماتریس L کدام هرگاه ماتریس است؟

$$\frac{1}{2} \quad .\cdot ۴$$

$$3 \cdot ۳$$

$$1 \cdot ۲$$

$$\frac{1}{2} \quad .\cdot ۱$$

- روش تصفیه تکراری برای چه هدفی به کار می رود؟

۲. تعیین میزان خطای جواب

۱. کاهش خطای جواب تقریبی دستگاه معادلات

۴. اصلاح مقادیر سمت راست دستگاه معادلات

۳. بدست آوردن جواب تقریبی اولیه



- ۸- عدد شرطی ماتریس A به چه صورتی تعریف می شود؟

$$C(A) = \frac{\|A\|}{\|A^{-1}\|} \quad .2$$

$$C(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \quad .1$$

$$C(A) = \frac{\det(A)}{\det(A^{-1})} \quad .4$$

$$C(A) = \det(A) \cdot \det(A^{-1}) \quad .3$$

- ۹- جواب تقریبی دستگاه معادلات زیر به روش ژاکوبی بعد از یک تکرار کدام است؟

$$\begin{cases} 10x - 2y - z = 3 \\ -x + 5y - z = 6 \\ -x - y + 2z = 3 \end{cases}$$

$X^0 = (0,0,0)$ با فرض

$$X^1 = (1,0,1) \quad .4$$

$$X^1 = (1,1,1) \quad .3$$

$$X^1 = (0.3,1.2,1.5) \quad .2$$

$$X^1 = (0.7,1.5,2.25) \quad .1$$

- ۱۰- هرگاه A یک ماتریس ۳ قطری و معین مثبت باشد مقدار بهینه پارامتر روش SOR کدام است؟

$$w = \frac{2}{1 - \sqrt{1 - [\rho(B_j)]^2}} \quad .2$$

$$w = \frac{1}{1 - \sqrt{1 - [\rho(B_j)]^3}} \quad .1$$

$$w = \frac{1}{1 + \sqrt{1 - [\rho(B_j)]^3}} \quad .4$$

$$w = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - [\rho(B_j)]^2}} \quad .3$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad .11$$

چند جمله‌ای مشخصه ماتریس
کدام است؟

$$\lambda^2 + \lambda - 2 \quad .4$$

$$\lambda^2 + \lambda + 2 \quad .3$$

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 \quad .2$$

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 \quad .1$$

- ۱۲- هرگاه A یک ماتریس حقیقی و پادمتناظر باشد مقادیر ویژه آن به چه صورتی هستند؟

۴. مثبت

۳. ناصل

۲. صفر یا موهومی محض

۱. حقیقی

- ۱۳- بردارهای ویژه نظیر مقادیر ویژه متمایز ماتریس هرمیتی A کدام ویژگی زیر را دارند؟

۴. نرمال هستند.

۳. متعامدند.

۲. وابسته خطی اند.

۱. حقیقی اند.

- ۱۴- برای ماتریس مربعی A کدامیک از روابط زیر صحیح است؟

$$\|A\|_{\infty} < \rho(A) \quad .4$$

$$\rho(A) \leq \|A\|_1 \quad .3$$

$$\|A\|_1 < \rho(A) \quad .2$$

$$\|A\|_1 < \|A\|_{\infty} \quad .1$$



-۱۵- قضیه شور کدامیک از روابط زیر را بیان می کند؟

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i| < \|A\|_E \quad .4$$

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 < \|A\|_E^2 \quad .3$$

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 < \|A\|_1 \quad .2$$

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 < \|A\|_2^2 \quad .1$$

-۱۶- روش لورییر برای محاسبه چند جمله‌ای مشخصه یک ماتریس بر چه اساسی است؟

۲. روابط بین ریشه‌ها و ضرایب در یک چند جمله‌ای

۱. روابط بین مقادیر ویژه و دترمینان یک ماتریس

۴. گزینه‌های ۲ و ۳

۳. روابط بین مقادیر ویژه و اثر یک ماتریس

$$X^{(3)} = \begin{bmatrix} 51 \\ 77 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

-۱۷

بعد از یک تکرار دیگر به تقریب بزرگترین مقدار ویژه از نظر قدر مطلق برای ماتریس با فرض

روش توانی کدام است؟

۲،۵ .۴

۳،۰۸۴ .۳

۳،۹۸۷ .۲

۳،۱۲۵ .۱

-۱۸- در روش معکوس توانی کدامیک از مقادیر ویژه بدست می آیند؟

۲. بزرگترین مقدار ویژه A

۱. کوچکترین مقدار ویژه A

۴. بزرگترین مقدار ویژه A^{-1}

۳. معکوس کوچکترین مقدار ویژه A از نظر قدر مطلق

-۱۹- در روش تبدیلی ژاکوبی ماتریس A به چه ماتریسی تبدیل می شود؟

۴. ۳ قطری

۳. قطری

۲. پایین مثلثی

۱. بالا مثلثی

-۲۰- برای حل یک مساله مقدار مرزی به روش تفاضلات متناهی، معادله دیفرانسیل به چه مساله‌ای تقلیل می یابد؟

۲. دستگاه معادلات خطی

۱. معادله دیفرانسیل مرتبه ۱

۴. معادله انتگرال

۳. مساله مقدار اولیه

سوالات تشریحی

- نشان دهید یک ماتریس اکیدا قطر غالب نامنفرد است.

- دستگاه معادلات زیر را بروش تجزیه چولسکی حل کنید.

$$\begin{cases} 2x + 4y - 6z = -4 \\ x + 5y + 3z = 10 \\ x + 3y + 2z = 5 \end{cases}$$

۱،۴۰ نمره

۱،۴۰ نمره

نمره ۱،۴۰

-۳ معکوس ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ را با استفاده از رابطه کیلی هامیلتون به دست آورید.

۴- قضیه گرشگورین را بیان و اثبات کنید.

نمره ۱،۴۰

-۵ در روش توانی برای محاسبه بزرگترین مقدار ویژه مختلط ماتریس $A_{4 \times 4}$ هرگاه سه بردار نهایی به صورت زیر باشند، مقدار ویژه غالب این ماتریس را بدست آورید.

$$Y^{25} = (-11.99, 13.44, -13.44, 0) \quad Y^{24} = (0.15, 4.4, -4.4, 0) \quad \text{و} \quad Y^{23} = (0.99, 1, 0.99, 0)$$

| شماره سؤال | پاسخ صحيح | وضعیت کلید |
|---------------|-----------|------------|
| 1 | الف | عادی |
| 2 | الف | عادی |
| 3 | ب | عادی |
| 4 | د | عادی |
| 5 | ح | عادی |
| 6 | الف، د | عادی |
| 7 | الف | عادی |
| 8 | الف | عادی |
| 9 | ب | عادی |
| 10 | ح | عادی |
| 11 | الف | عادی |
| 12 | ب | عادی |
| 13 | ح | عادی |
| 14 | ح | عادی |
| 15 | ح | عادی |
| 16 | د | عادی |
| 17 | ب | عادی |
| 18 | ح | عادی |
| 19 | ح | عادی |
| 20 | ب | عادی |



سوالات تشریبی

نمره ۱.۴۰

- قضیه صفحه ۲۶ کتاب درسی

نمره ۱.۴۰

- مثال صفحه ۸۱ کتاب درسی

نمره ۱.۴۰

- مثال صفحه ۱۳۳ کتاب درسی

نمره ۱.۴۰

- قضیه صفحه ۱۴۰ کتاب

نمره ۱.۴۰

- مثال صفحه ۱۷۵ کتاب درسی



-۱ اگر $AB = AC$ باشد، در چه صورت می توان نتیجه گرفت $B = C$ ؟

۱. A مخالف صفر باشد.
۲. A مربعی باشد.
۳. C, B نامنفرد باشند.
۴. A نامنفرد باشد.

اگر $A = \begin{bmatrix} \circ & a+2 \\ -2a+1 & \circ \end{bmatrix}$ باشد، ماتریس پادمتقارن باشد، مقدار a چقدر است؟

۱. $\frac{-1}{3}$
۲. $\frac{1}{3}$
۳. $\frac{2}{3}$
۴. $\frac{3}{2}$

-۲ تعریف ماتریس سه قطری کدام است؟

$$|i-j| < 1 \quad a_{ij} = 0 \quad \text{برای } i \neq j$$

$$|i-j| > 1 \quad a_{ij} = 0 \quad \text{برای } i \neq j$$

$$|i-j| = 1 \quad a_{ij} = 0 \quad \text{برای } i \neq j$$

دترمینان ماتریس کدام است؟

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & \circ & \circ & \circ \\ 1 & 4 & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & -2 & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & 3 & -1 \\ \circ & \circ & \circ & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

۱. -10
۲. 20
۳. -20
۴. 25

-۳ ایده اصلی روش حذفی گاووس برای حل دستگاه معادلات $AX = b$ چیست؟

۱. تجزیه ماتریس ضرایب
۲. تبدیل دستگاه مورد نظر به یک دستگاه بالا مثلثی
۳. حذف معادلات زاید از دستگاه معادلات
۴. استفاده از جابجایی معادلات برای ساده شدن دستگاه معادلات

-۴ هرگاه $X = (-3, 4, -5, 0)$ باشد، در اینصورت $\|X\|_3$ برابر است با:

۱. 6
۲. 5
۳. $\sqrt[3]{34}$
۴. 12



-۷ مزیت روش تجزیه مثلثی نسبت به روش حذفی گاوس کدام است؟

- .۱. حجم محاسبات کمتری دارد.
- .۲. برای حل دستگاه با چند طرف ثانی مناسب تر است.
- .۳. خطای کمتری دارد.
- .۴. برای دستگاه معادلات با مرتبه بزرگ مناسب تر است.

-۸ کدام مورد با بقیه معادل نیست؟

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = O \quad .4 \qquad |A| \neq 0 \quad .3 \qquad \|A\| < 1 \quad .2 \qquad \rho(A) < 1 \quad .1$$

-۹ در تجزیه مثلثی ماتریس $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -2 & -4 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ به روش کرووت به صورت LU مقادیر U_{13} و l_{22} به ترتیب کدامند؟

$$2, -\frac{3}{4} \quad .4 \qquad \frac{5}{2}, -\frac{1}{4} \quad .3 \qquad -2, \frac{3}{4} \quad .2 \qquad -\frac{5}{2}, -\frac{1}{4} \quad .1$$

-۱۰ ماتریس روش ژاکوبی برای دستگاه $\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 7 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 8 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 9 \end{cases}$ کدام است؟

$$B_j = \begin{bmatrix} \circ & \frac{-4}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{-1}{2} & \circ & \frac{1}{4} \\ 1 & 1 & \circ \end{bmatrix} \quad .2$$

$$B_j = \begin{bmatrix} 1 & \frac{4}{3} & \frac{-1}{3} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{-1}{4} \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad .1$$

$$B_j = \begin{bmatrix} \circ & \frac{4}{3} & \frac{-1}{3} \\ \frac{1}{2} & \circ & \frac{-1}{4} \\ -1 & -1 & \circ \end{bmatrix} \quad .4$$

$$B_j = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad .3$$

-۱۱ اگر در دستگاه $Ax = b$ ، ماتریس A سه قطری و معین مثبت باشد و شاعع طیفی ماتریس روش تکراری ژاکوبی برای آن باشد، بهترین انتخاب ω برای روش SOR کدام است؟

$$1/75 \quad .4 \qquad 1/25 \quad .3 \qquad 2/25 \quad .2 \qquad 0/75 \quad .1$$



-۱۲ اگر ماتریس $A_{4 \times 4}$ دارای معادله مشخصه $P(\lambda) = \lambda^4 - 3\lambda^3 + 2\lambda - 5$ باشد، مقادیر $\det(A)$ و $tr(A)$ به ترتیب کدامند؟

۴. ۵ و ۶

۳ و ۲

۲ و ۳

۱. ۵ و ۳

-۱۳ هرگاه چند جمله مشخصه ماتریس A به صورت $P(\lambda) = \lambda^4 - 3\lambda^3 + 2\lambda - 5$ باشد، وارون ماتریس A از کدام رابطه به دست می آید؟

$$A^{-1} = -\frac{1}{5}(A^3 - 3A^2 + 2I) \quad .2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5}(A^3 + 3A^2 - 2I) \quad .1$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5}(A^3 - 3A^2 + 2I) \quad .4$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{5}(A^3 + 3A^2 - 2I) \quad .3$$

-۱۴ اگر $-1, 2, 3$ و -3 مقادیر ویژه A باشند، مقادیر ویژه ماتریس $A^4 - 10I$ کدام است؟

۴. ۶ و ۹

۳. ۱۱ و ۲۶

۲. ۹ و ۶

۱. ۱ و ۱۶

-۱۵ کدام گزینه از دوایر گرشگورین برای ماتریس A می باشد؟

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & 7 \\ 1 & -3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$|z+4| \leq 6 \quad .4$$

$$|z+1| \leq 3 \quad .3$$

$$|z-4| \leq 6 \quad .2$$

$$|z-1| \leq 7 \quad .1$$

-۱۶ اگر A ماتریس حقیقی و پاد متقارن باشد، مقادیر ویژه آن:

- ۱. موهمی و مثبت است.
- ۲. حقیقی و مثبت است.
- ۳. غیر صفر است.
- ۴. صفر یا موهمی محض است.

-۱۷ اگر $\|A\|_2$ باشد، کدام است؟

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

۴. ۴

 $\sqrt{5}$.3 $2\sqrt{5}$.2

20. 1



-۱۸ اگر ماتریس A دارای مقادیر ویژه $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$ باشد، سرعت همگرایی روش تکراری توانی برای تقریب λ_1 به کدام پارامتر بستگی دارد؟

$$(\lambda_1 \lambda_2)^2 \cdot 4$$

$$\lambda_1 \lambda_2 \cdot 3$$

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \cdot 2$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \cdot 1$$

-۱۹ اگر $\lambda_1 = 11$ و $Y_1 = (0/5, 1, 0/75)^t$ به ترتیب بزرگترین مقدار ویژه و بردار ویژه متناظر آن در ماتریس

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 10 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$-5 \cdot 1 \cdot 4$$

$$4 \cdot 1 \cdot 3$$

$$3 \cdot 2 \cdot 2$$

$$-3 \cdot -2 \cdot 1$$

-۲۰ فرمول تقریبی $\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$ تقریبی از و دارای خطای برشی از مرتبه می باشد.

$$O(h) \cdot y'_i \cdot 4$$

$$O(h^2) \cdot y'_i \cdot 3$$

$$O(h^2) \cdot y''_i \cdot 2$$

$$O(h) \cdot y''_i \cdot 1$$

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

-۱ ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ را به روش چولسکی به صورت مثلثی LU تجزیه کنید.

نمره ۱،۴۰

-۲ با تغییر ترتیب معادلات دستگاه طوری که روش ژاکوبی برای آن همگرا باشد، این روش $\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 7 \\ x_1 - 3x_2 + 7x_3 = 16 \\ 5x_1 + x_2 + x_3 = 10 \end{cases}$ و تا دو تکرار انجام دهید. (محاسبات با ۴ رقم اعشار باشد.)

-۳ تکراری را برای آن با $X^{(0)} = \begin{bmatrix} \circ \\ \circ \\ \circ \\ \circ \end{bmatrix}$ و تا دو تکرار انجام دهید. (محاسبات با ۴ رقم اعشار باشد.)

نمره ۱،۴۰

-۴ مقدار ویژه غالب ماتریس $A = \begin{bmatrix} \circ & 11 & -5 \\ -2 & 17 & -7 \\ -4 & 26 & -10 \end{bmatrix}$ را به روش تکرار توانی با $Y^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ تا دو تکرار محاسبه کنید. (محاسبات با ۴ رقم اعشار باشد.)

نمره ۱،۴۰

-۴ چندجمله‌ای مشخصه ماتریس سه قطری متقارن
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}$ را به روش بازگشتی به دست آورید.

نمره ۱،۴۰

- معادله دیفرانسیل زیر را به ازای $h = {}^{\circ}/2$ به روش تفاضلات متناهی حل کنید.(حل دستگاه نهایی لازم نیست).
 $y'' + (\sin x)y' - (\cos x)y = \ln x, \quad 1 \leq x \leq 2$
 $y(1) = 1$
 $y(2) = 0$



| شماره سوال | پاسخ صحیح | وضعیت کلید |
|------------|-----------|------------|
| 1 | د | عادی |
| 2 | ب | عادی |
| 3 | الف | عادی |
| 4 | ج | عادی |
| 5 | ب | عادی |
| 6 | الف | عادی |
| 7 | ب | عادی |
| 8 | ج | عادی |
| 9 | الف | عادی |
| 10 | ب | عادی |
| 11 | ج | عادی |
| 12 | الف | عادی |
| 13 | د | عادی |
| 14 | د | عادی |
| 15 | ب | عادی |
| 16 | د | عادی |
| 17 | ب | عادی |
| 18 | ب | عادی |
| 19 | الف | عادی |
| 20 | ج | عادی |



سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

۱- مثال ۱۳ صفحه ۸۱ کتاب.

نمره ۱،۴۰

۲- صفحه ۱۰۸ کتاب.

نمره ۱،۴۰

۳- مثال ۱۴ صفحه ۱۶۱ کتاب.

نمره ۱،۴۰

۴- تمرین ۲۲ صفحه ۲۱۰ کتاب.

نمره ۱،۴۰

۵- تمرین ۲ صفحه ۲۲۸ کتاب.



- اگر A یک ماتریس $n \times n$ باشد و $\text{rank}(A) < n$ ، کدام گزینه صحیح است؟

۱. دستگاه $AX = b$ بی نهایت جواب دارد.

۲. دستگاه $AX = b$ جواب یکتا دارد.

۳. تعداد ستونهای مستقل خطی ماتریس A برابر n است.

۴. تعداد سطرهای مستقل خطی ماتریس A کمتر از n است.

- کدام گزینه صحیح است؟

۱. اگر ماتریس A قطری غالب باشد، نامنفرد است.

۲. هر ماتریس مربعی بادو سطر یکسان نامنفرد است.

۳. اگر ماتریس A متعامد باشد، منفرد است.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & -1 \\ -2 & 0 & 6 \end{bmatrix} \quad -\text{۳}$$

اگر A باشد کدام گزینه صحیح است؟

$$\|A\|_{\infty} = 8 \quad -\text{۲}$$

$$\|A^T\|_1 - \|A\|_{\infty} = 0 \quad -\text{۱}$$

$$\|A^T\|_1 = 0 \quad -\text{۴}$$

$$\|A\|_1 = 10 \quad -\text{۳}$$

- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱. مجموع دو ماتریس متقارن هم مرتبه متقارن نیست.

۲. اگر A یک ماتریس غیرصفر باشد آنگاه $\text{tr}(AA^t) > 0$

۳. عناصر قطری یک ماتریس پادمتقارن مثبت هستند.

۴. در هر نرم طبیعی رابطه $\rho(A) > \|A\|$ برقرار است.



۵- کدام یک از گزینه ها در مورد تجزیه مثلثی یک ماتریس، صحیح است؟

۱. در تجزیه چولسکی مقادیر قطری ماتریس های L, U باهم برابر و غیریک اند.
۲. در تجزیه دولیتل مقادیر قطری ماتریس U یک است.
۳. در تجزیه کروت مقادیر قطری ماتریس L یک است.
۴. در تجزیه دولیتل مقادیر قطری ماتریس L یک است.

۶- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$ باشد، عدد شرطی ماتریس A کدام است؟

$$\frac{1}{408} \quad .\cdot 4$$

$$748 \quad .\cdot 3$$

$$\frac{1}{12} \quad .\cdot 2$$

$$1 \quad .\cdot 1$$

۷- در روش تکراری گاووس-سایدل به صورت $X^{(k)} = BX^{(k-1)} + C$ برای حل دستگاه معادلات خطی $AX = b$ از کدام رابطه زیر بدست می آیند؟

$$B = (L + U)^{-1}D, C = -(L + D)^{-1}b \quad .\cdot 1$$

$$B = (L + D)^{-1}b, C = -(L + D)^{-1}U \quad .\cdot 2$$

$$B = -(L + D)^{-1}b, C = (L + D)^{-1}U \quad .\cdot 3$$

$$B = -(L + D)^{-1}U, C = (L + D)^{-1}b \quad .\cdot 4$$



- ۸- مقدار بهینه تقریبی پارامتر ω در تسریع همگرایی روش SOR , برای ماتریس سه قطری و معین مثبت

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

کدام گزینه است؟

۲ .۴

0.625 .۳

0.81 .۲

1.24 .۱

- ۹- اگر مقادیر ویژه ماتریس $A_{2 \times 2}$ ، $A = 1, 4$ باشند، ماتریس A در کدام رابطه زیر صدق می کند؟

$$A^2 - 5A = 4I$$

$$A^2 - 3A = 4I$$

$$A^2 + 3A + 4I = 0$$

$$A^2 - 5A + 4I = 0$$

- ۱۰- کدام گزینه صحیح است؟

۱. مربع مقادیر ویژه هر ماتریس متعامد، یک است.

۲. برای هر ماتریس، بردارهای ویژه نظیر مقادیر ویژه متمایز، متعامدند.

۳. مقادیر ویژه ماتریس های A و A^{-1} یکسان هستند.

۴. مقادیر ویژه یک ماتریس معین مثبت، موهومی اند.

- ۱۱- در مورد شاعع طیفی ماتریس A کدام گزینه صحیح است؟

$$\rho(A) = \|A\|_2^2 \quad \text{اگر } A \text{ ماتریسی متقارن باشد آنگاه}$$

$$\rho(A) \leq \|A\|_\infty \quad \text{اگر } A \text{ ماتریسی متقارن و معین نامنفی باشد آنگاه}$$

$$\rho(A) = \min_{\|X\|_2=1} X^t A X \quad \text{اگر } A \text{ ماتریسی متقارن و معین نامنفی باشد آنگاه}$$

$$\rho(A^t A) = \|A\|_2 \quad \text{اگر } A \text{ ماتریسی متقارن و معین نامنفی باشد آنگاه}$$



۶ . ۴

-6 . ۳

1 . ۲

-1 . ۱

$$\frac{\rho(A)}{\rho(A^{-1})} \text{ مقدار } A = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \quad -12$$

فرض کنید

$$Y^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{با انتخاب } A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \quad -13$$

کدام است؟ با استفاده از روش کریلف چند جمله‌ای مشخصه‌ی ماتریس

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 3 \quad . ۲$$

۱. بردار اولیه‌ی (0) Y مناسب انتخاب نشده است.

$$p(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 3 \quad . ۴$$

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 3 \quad . ۳$$

-14 کدام یک از روش‌های زیر برای تعیین چندجمله‌ای مشخصه یک ماتریس، بر مبنای روابط نیوتن برای حاصل جمع توان‌های مختلف ریشه‌های یک معادله جبری عمل می‌کند؟

۴. روش توانی

۳. روش لوییر

۲. روش ضرایب نامعین

۱. روش کریلف

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{از نظر قدر مطلق و بعد از دو تکرار از روش} \quad -15$$

با انتخاب $Y^{(0)} = (1,1)^t$ ، بزرگترین مقدار ویژه ماتریس توانی کدام است؟

۵ . ۴

$$\frac{19}{5} \quad . ۳$$

3 . ۲

$$\frac{13}{5} \quad . ۱$$

-16 اگر $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$ مقادیر ویژه ماتریس A باشند، سرعت همگرایی روش توانی برای تعیین بزرگترین مقدار ویژه ماتریس A^5 به چه عاملی بستگی دارد؟

$$|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}|^5 \quad . ۴$$

$$|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}| \quad . ۳$$

$$|\frac{\lambda_1}{\lambda_2}|^5 \quad . ۲$$

$$|\frac{\lambda_1}{\lambda_2}| \quad . ۱$$



-۱۷ روش حذفی گوس بدون محورگیری برای حل دستگاه $AX = b$ پایدار است هرگاه

۱. ماتریس A معین مثبت باشد.
۲. ماتریس A متعامد باشد.
۳. ماتریس A هستبرگی باشد.

-۱۸ اگر تبدیلات گیونز روی ماتریس نامتقارن A اعمال شود، ماتریس A به کدام ماتریس تبدیل می‌گردد؟

۱. ماتریس ترانهاده‌ی مزدوج
۲. ماتریس پایین هستبرگی
۳. ماتریس سه قطری
۴. ماتریس پایین مثلثی

-۱۹ ماتریس P که روش هاووس هلدر مبتنی بر استفاده از آن می‌باشد، دارای کدام یک از ویژگی‌های زیر است؟

۱. ماتریسی متقارن و متعامد است و $V^t V = I_n$ که در آن V برداری است که $P = 2VV^t$
۲. ماتریسی متقارن و متعامد است و $\|V\| = 1$ که در آن V برداری است که $P = VV^t - I_n$
۳. ماتریسی غیر متقارن است و $V^t V = I_n$ که در آن V برداری است که $P = I_n - V^t V$
۴. ماتریسی متقارن و متعامد است و $V^t V = 1$ که در آن V برداری است که $P = I_n - 2VV^t$

-۲۰ اگر در روش QR ماتریس نامنفرد A را به صورت $A = QR$ تجزیه کنیم، کدام گزینه صحیح است؟

۱. Q یک ماتریس متعامد و R یک ماتریس بالا مثلثی است.
۲. Q یک ماتریس متقارن و R یک ماتریس بالا مثلثی است.
۳. Q یک ماتریس متقارن و R یک ماتریس پایین مثلثی است.
۴. Q یک ماتریس بالا مثلثی و R یک ماتریس پایین مثلثی است.

سوالات تشریحی

نمره ۱۴۰

- دستگاه معادلات زیر را با استفاده از تجزیه دولیتل حل کنید

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 - x_3 = -2 \\ -2x_1 - 4x_2 + 5x_3 = 20 \\ x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 7 \end{cases}$$

نمره ۱،۴۰

- ثابت کنید اگر A یک ماتریس هرمیتی باشد آنگاه بردارهای ویژه A نظیر مقادیر ویژه متمایز، متعامدند.

نمره ۱،۴۰

- دستگاه معادلات زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 7 \\ x_1 - 3x_2 + 7x_3 = 16 \\ 5x_1 + x_2 + x_3 = 10 \end{cases}$$

ابتدا ترتیب معادلات را به گونه‌ای تغییر دهید که روش ژاکوبی برای حل این دستگاه همگرا باشد. سپس دو تکرار از این روش را برای تعیین جواب فوق بدست آورید. $X^{(0)} = (0, 0, 0)^t$ انتخاب نمایید.

نمره ۱،۴۰

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 10 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix} \quad -4$$

فرض کنید $\lambda_1 = 11$ بزرگترین مقدار ویژه ماتریس A باشد. اگر $X^{(1)} = (0.5, 1, 0.75)^t$ نظیر λ_1 باشد، مجموع دو مقدار ویژه دیگر ماتریس A را به یکی از روشهای تقلیل بدست آورید.

نمره ۱،۴۰

- دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول زیر را حل کنید.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x(t) - 2y(t) \\ \frac{dy}{dt} = -2x(t) + 3y(t) \end{cases}$$



| شماره سوال | پاسخ صحیح | وضعیت کلید |
|------------|-----------|------------|
| 1 | د | عادی |
| 2 | الف | عادی |
| 3 | الف | عادی |
| 4 | ب | عادی |
| 5 | د | عادی |
| 6 | ج | عادی |
| 7 | د | عادی |
| 8 | الف | عادی |
| 9 | الف | عادی |
| 10 | الف | عادی |
| 11 | ب | عادی |
| 12 | د | عادی |
| 13 | الف | عادی |
| 14 | ج | عادی |
| 15 | ج | عادی |
| 16 | د | عادی |
| 17 | الف | عادی |
| 18 | ب | عادی |
| 19 | د | عادی |
| 20 | الف | عادی |

سوالات تشریحینمره ۱،۴۰

۱- تمرین ۱۲ صفحه ۱۱۷

مشابه مثال ۱۱ صفحه ۷۸

نمره ۱،۴۰

۲- قضیه ۱۵ صفحه ۱۳۵

نمره ۱،۴۰

۳- مثال ۲۴ صفحه ۱۰۷

نمره ۱،۴۰

۴- مثال ۲۱ صفحه ۲۱ و مثال ۲۰ صفحه ۱۸۱.

نمره ۱،۴۰

۵- ماتریس ضرایب دستگاه عبارت است: $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$
 که مقادیر ویژه آن برابر است با $\lambda_2 = 5, \lambda_1 = 1$ و بردارهای ویژه آن

$$X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

می باشد. بنابراین جواب دستگاه نظیر $\lambda_1 = 1$ عبارت است از
 $x(t) = e^{5t}$ و $y(t) = e^t$

و همچنین جواب معادله دیفرانسیل نظیر $\lambda_2 = 5$ برابر است با $y(t) = -e^{5t}$ که فرم برداری

آنها به صورت زیر بیان می شود:

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = e^{5t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

بنابراین جواب عمومی دستگاه عبارت است از:
 $\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = r_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + r_2 e^{5t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

که در آن r_2, r_1 ثابت های دلخواه هستند.



-۱ در دستگاه $Ax = b$ که A ماتریسی $m \times n$ است، هرگاه $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ در این صورت:

- ۲. دستگاه جواب منحصر بفرد دارد.
- ۳. دستگاه فاقد جواب است.
- ۴. دستگاه بیش از دو جواب دارد.

-۲ فرض کنید A ماتریسی $n \times n$ باشد. اگر دو برابر سطر اول را به سطر دوم اضافه، سپس سطر دوم را با سطر سوم تعویض کنیم و ماتریس حاصل را B بنامیم، آنگاه

$$\det(B) = \det(A) \quad .\ 2 \qquad \det(B) = 2 \det(A) \quad .\ 1$$

- ۴. در ارتباط با دترمینان B نمی‌توان اظهار نظر کرد.
- ۳. $\det(B) = -\det(A)$

-۳ فرض کنید A یک ماتریس مربعی از مرتبه n باشد. کدام یک از عبارات زیر با وارون پذیری A معادل نیست؟

$$\text{rank}(A) = n \quad .\ 2 \qquad \det(A) \neq 0 \quad .\ 1$$

- ۴. A اکیدا قطر غالب باشد.
- ۳. $\text{rank}(A') = n$

-۴ فرض کنید A ماتریسی $n \times n$ باشد. اگر $AX = b$ ، آنگاه دستگاه معادله $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ باشد. در این صورت:

- ۲. بینهایت جواب دارد.
- ۳. جواب یکتا دارد.
- ۴. نمی‌توان اظهار نظر کرد.

-۵ اگر $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ، آنگاه مقدار $\text{tr}(A^4)$ برابر است با

$$0 \quad .\ 4 \qquad 2 \quad .\ 3 \qquad 4 \quad .\ 2 \qquad 8 \quad .\ 1$$

-۶ فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. در این صورت

$$\|A\|_1 = 4, \|A\|_\infty = 5 \quad .\ 4 \qquad \|A\|_1 = 3, \|A\|_\infty = 4 \quad .\ 3 \qquad \|A\|_\infty = 3, \|A\|_1 = 4 \quad .\ 2 \qquad \|A\|_\infty = 4, \|A\|_1 = 5 \quad .\ 1$$

-۷ فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$. کدام یک از بردارهای زیر می‌تواند یک بردار ویژه وابسته به مقدار ویژه $\lambda = 2$ باشد؟

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad .\ 4 \qquad X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad .\ 3 \qquad X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad .\ 2 \qquad X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad .\ 1$$



۸- در حل دستگاه معادله به روش حذفی گاوس و محورگیری جزئی، اولین گام کدام گزینه است؟

$$\begin{cases} 0.33x + 0.25y + 0.2z = 0 \\ 0.32x + 0.23y + 0.23z = 1 \\ 0.34x + 0.24y + 0.23z = 2 \end{cases}$$

۱. جابجایی سطر اول و دوم
۴. صفر کردن عنصر a_{33} در ماتریس افزوده

۹- اگر LU تجزیه ماتریس به روش دولیتل باشد، آنگاه مقدار $L_{21}U_{33}$ برابر است با

$$\frac{1}{3} \cdot ^4 \quad \quad \quad 3 \cdot ^3 \quad \quad \quad \frac{2}{3} \cdot ^2 \quad \quad \quad \frac{3}{2} \cdot ^1$$

۱۰- معادله $\begin{cases} 10x - 2y - z = 3 \\ -x + 5y - z = 6 \\ -x - y + 2z = 3 \end{cases}$ را در نظر بگیرید. با فرض $X^{(0)} = (0, \frac{1}{2}, 1)$ بردار $X^{(1)}$ به روش ژاکوبی برابر است با

$$X^{(1)} = (\frac{1}{2}, \frac{7}{5}, \frac{7}{4}) \cdot ^4 \quad X^{(1)} = (\frac{1}{2}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}) \cdot ^3 \quad X^{(1)} = (\frac{3}{10}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}) \cdot ^2 \quad X^{(1)} = (\frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{2}) \cdot ^1$$

۱۱- دنباله $X^{(k)} = BX^{(k-1)} + C$ با $C \neq 0$ را در نظر بگیرید. در این صورت کدام عبارت نادرست است؟

۱. اگر $\rho(B) < 1$ ، آنگاه دنباله $X^{(k)}$ به ازای هر انتخاب $X^{(0)}$ همگراست.
۲. اگر به ازای هر انتخاب $X^{(0)}$ ، دنباله $X^{(k)}$ همگرا باشد، آنگاه $\rho(B) < 1$.
۳. اگر $\|B\| < 1$ ، آنگاه دنباله $X^{(k)}$ به ازای هر انتخاب $X^{(0)}$ همگراست.
۴. اگر به ازای هر انتخاب $X^{(0)}$ ، دنباله $X^{(k)}$ همگرا باشد، آنگاه $\|B\| < 1$.

۱۲- روش تصحیح باقیماده روشی است برای ...

۱. بدست آوردن جواب یک دستگاه معادلات
۴. اصلاح جواب تقریبی بدست آمده یک دستگاه معادلات
۳. کاهش خطای اولیه دستگاه



-۱۳

فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. در این صورت مقدار عددی $tr(A^2) + \det(A^3)$ برابر است با

14 . ۴

10 . ۳

8 . ۲

4 . ۱

-۱۴ - کدام یک از عبارات زیر درست است؟

۱. اگر A ماتریسی حقیقی و متنقارن باشد، آنگاه مقادیر ویژه A صفر یا موهومی محض اند.۲. مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس‌های A و A' باهم برابرند.

۳. مقادیر ویژه ماتریس‌های بالامثلی همان عناصر روی قطر اصلی اند.

۴. دترمینان یک ماتریس با مجموع مقادیر ویژه آن ماتریس برابر است.

-۱۵

فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$. با استفاده از قضیه کیلی-همیلتون مقدار $A^2 - 6A + 6I$ برابر است با

- A^2 . ۴ A^2 . ۳- A . ۲

A . ۱

-۱۶ - با استفاده از روش لوربیر و با فرض $5tr(A) = tr(A^2) = -tr(A^3) = 10$ ، چندجمله‌ای مشخصه A برابر است با

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 + 3\lambda + 12 = 0 \quad . ۲$$

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - 3\lambda + 12 = 0 \quad . ۱$$

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - 3\lambda - 12 = 0 \quad . ۴$$

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 + 3\lambda - 12 = 0 \quad . ۳$$

-۱۷

هرگاه θ زاویه مورد نیاز در روش گیونز برای تبدیل ماتریس به یک ماتریس سه‌قطري باشد در این

صورت:

$$\tan(\theta) = \sqrt{2} \quad . ۴$$

$$\tan(\theta) = 2 \quad . ۳$$

$$\tan(\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad . ۲$$

$$\tan(\theta) = 1 \quad . ۱$$

-۱۸

فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$. اگر $Y^{(1)}$ و $Y^{(2)}$ بردارهای بدست آمده از روش کریلف با استفاده از بردار اولیه

$$Y^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
 باشند، آنگاه مقدار $Y^{(1)^t} \cdot Y^{(2)}$ برابر است با

84 . ۴

64 . ۳

24 . ۲

1 . ۱



-۱۹

محدوده مقادیر ویژه ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 & 0.25 \\ 0.5 & 0.25 & 1.25 \end{bmatrix}$ کدام گزینه می‌تواند باشد.

۱. دایره‌ای به مرکز 1.25 و به شعاع 0.5

۲. دایره‌ای به مرکز 1 و به شعاع 0.5

۳. دایره‌ای به مرکز 1 و به شعاع 1

۴. دایره‌ای به مرکز 1.25 و به شعاع 0.75

-۲۰

جواب عمومی دستگاه $\begin{cases} u'(t) = 2u(t) + 6v(t) \\ v'(t) = -2u(t) - 5v(t) \end{cases}$ برابر است با

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = r_1 e^{-t} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + r_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix} . ۲$$

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = r_1 e^{-t} \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} + r_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} . ۱$$

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = r_1 e^{-t} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + r_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} . ۴$$

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = r_1 e^{-t} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} + r_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} . ۳$$

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

نشان دهید ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ یک ماتریس معین مثبت است.

نمره ۱،۴۰

دستگاه معادله را به روش تجزیه کروت حل نمایید.

$$\begin{cases} 2x + 4y - 6z = -4 \\ x + 5y + 3z = 10 \\ x + 3y + 2z = 5 \end{cases}$$

نمره ۱،۴۰

دستگاه $\begin{cases} px + y = 1 \\ x + py + z = 2 \\ y + pz = 3 \end{cases}$ را در نظر بگیرید. نشان دهید روش ژاکوبی همگراست اگر و تنها اگر $p > \sqrt{2}$.

نمره ۱،۴۰

تقریبی از مقدار ویژه غالب سه مرحله کافی است)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$Y^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

نمره ۱،۴۰

با استفاده از تبدیلات گیونز، ماتریس سه قطری تبدیل نموده و سپس چندجمله‌ای مشخصه آن را بدست آورید.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$



| شماره سوال | پاسخ صحیح | وضعیت کلید |
|------------|-----------|------------|
| ۱ | ب | عادی |
| ۲ | ج | عادی |
| ۳ | د | عادی |
| ۴ | ب | عادی |
| ۵ | الف | عادی |
| ۶ | ج | عادی |
| ۷ | الف | عادی |
| ۸ | ب | عادی |
| ۹ | الف | عادی |
| ۱۰ | د | عادی |
| ۱۱ | د | عادی |
| ۱۲ | ب | عادی |
| ۱۳ | د | عادی |
| ۱۴ | ج | عادی |
| ۱۵ | ب | عادی |
| ۱۶ | الف | عادی |
| ۱۷ | ب | عادی |
| ۱۸ | ج | عادی |
| ۱۹ | ج | عادی |
| ۲۰ | د | عادی |



سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

۱- مثال ۲۴ صفحه ۱۴

نمره ۱،۴۰

۲- مثال صفحه ۷۹ کتاب درسی

نمره ۱،۴۰

۳- تمرین ۲۴ صفحه ۱۱۹ کتاب درسی

نمره ۱،۴۰

۴- مثال ۱۳ صفحه ۱۶۰ کتاب درسی

نمره ۱،۴۰

۵- مثال ۲۵ صفحه ۱۹۸ کتاب درسی



-۱ در دستگاه $Ax = b$ که A ماتریسی $m \times n$ است، هرگاه $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ در این صورت:

- ۲. دستگاه جواب منحصر بفرد دارد.
- ۴. دستگاه بیش از دو جواب دارد.
- ۳. دستگاه بی نهایت جواب دارد.

-۲ فرض کنید A ماتریسی $n \times n$ باشد. اگر دو برابر سطر اول را به سطر دوم اضافه، سپس سطر دوم را با سطر سوم تعویض کنیم و ماتریس حاصل را B بنامیم، آنگاه

$$\det(B) = \det(A) \quad .\ 2 \qquad \det(B) = 2 \det(A) \quad .\ 1$$

- ۴. در ارتباط با دترمینان B نمی‌توان اظهار نظر کرد.
- ۳. $\det(B) = -\det(A)$

-۳ فرض کنید A یک ماتریس مربعی از مرتبه n باشد. کدام یک از عبارات زیر با وارون پذیری A معادل نیست؟

$$\text{rank}(A) = n \quad .\ 2 \qquad \det(A) \neq 0 \quad .\ 1$$

- ۴. A اکیدا قطر غالب باشد.
- ۳. $\text{rank}(A') = n$

-۴ فرض کنید A ماتریسی $n \times n$ باشد. اگر $AX = b$ ، آنگاه دستگاه معادله

- ۲. بینهایت جواب دارد.
- ۳. جواب یکتا دارد.
- ۴. نمی‌توان اظهار نظر کرد.
- ۱. جواب ندارد.

-۵ اگر $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ، آنگاه مقدار $\text{tr}(A^4)$ برابر است با

$$0 \quad .\ 4 \qquad 2 \quad .\ 3 \qquad 4 \quad .\ 2 \qquad 8 \quad .\ 1$$

-۶ فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. در این صورت

$$\|A\|_1 = 4, \|A\|_\infty = 5 \quad .\ 4 \qquad \|A\|_1 = 3, \|A\|_\infty = 4 \quad .\ 3 \qquad \|A\|_\infty = 3, \|A\|_1 = 4 \quad .\ 2 \qquad \|A\|_\infty = 4, \|A\|_1 = 5 \quad .\ 1$$

-۷ فرض کنید $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$. کدام یک از بردارهای زیر می‌تواند یک بردار ویژه وابسته به مقدار ویژه $\lambda = 2$ باشد؟

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad .\ 4 \qquad X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad .\ 3 \qquad X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad .\ 2 \qquad X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad .\ 1$$



۸- در حل دستگاه معادله به روش حذفی گاوس و محورگیری جزئی، اولین گام کدام گزینه است؟

$$\begin{cases} 0.33x + 0.25y + 0.2z = 0 \\ 0.32x + 0.23y + 0.23z = 1 \\ 0.34x + 0.24y + 0.23z = 2 \end{cases}$$

۱. جابجایی سطر اول و دوم
۲. جابجایی سطر اول و سوم
۳. صفر کردن عنصر a_{23} در ماتریس افزوده
۴. صفر کردن عنصر a_{33} در ماتریس افزوده

۹- اگر LU تجزیه ماتریس باشد، آنگاه مقدار $U_{21}l_3$ برابر است با

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{3} \cdot ^4 \quad \quad \quad 3 \cdot ^3 \quad \quad \quad \frac{2}{3} \cdot ^2 \quad \quad \quad \frac{3}{2} \cdot ^1$$

۱۰- معادله $\begin{cases} 10x - 2y - z = 3 \\ -x + 5y - z = 6 \\ -x - y + 2z = 3 \end{cases}$ را در نظر بگیرید. با فرض $X^{(0)} = (0, \frac{1}{2}, 1)$ بردار $X^{(1)}$ به روش ژاکوبی برابر است با

$$X^{(1)} = (\frac{1}{2}, \frac{7}{5}, \frac{7}{4}) \quad .^4 \quad X^{(1)} = (\frac{1}{2}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}) \quad .^3 \quad X^{(1)} = (\frac{3}{10}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}) \quad .^2 \quad X^{(1)} = (\frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{2}) \quad .^1$$

۱۱- دنباله $X^{(k)} = BX^{(k-1)} + C$ با $C \neq 0$ را در نظر بگیرید. در این صورت کدام عبارت نادرست است؟

۱. اگر $\rho(B) < 1$ ، آنگاه دنباله $X^{(k)}$ به ازای هر انتخاب $X^{(0)}$ همگراست.
۲. اگر به ازای هر انتخاب $X^{(0)}$ ، دنباله $X^{(k)}$ همگرا باشد، آنگاه $\rho(B) < 1$.
۳. اگر $\|B\| < 1$ ، آنگاه دنباله $X^{(k)}$ به ازای هر انتخاب $X^{(0)}$ همگراست.
۴. اگر به ازای هر انتخاب $X^{(0)}$ ، دنباله $X^{(k)}$ همگرا باشد، آنگاه $\|B\| < 1$.

۱۲- روش تصحیح باقیماده روشی است برای ...

۱. بدست آوردن جواب یک دستگاه معادلات
۲. اصلاح جواب تقریبی بدست آمده یک دستگاه معادلات
۳. کاهش خطای اولیه دستگاه
۴. بهبود خطای مقادیر سمت راست دستگاه معادلات



$$\text{فرض کنید } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad -13$$

در این صورت مقدار عددی $tr(A^2) + \det(A^3)$ برابر است با

14 . ۴

10 . ۳

8 . ۲

4 . ۱

-14 - کدام یک از عبارات زیر درست است؟

۱. اگر A ماتریسی حقیقی و متنقارن باشد، آنگاه مقادیر ویژه A صفر یا موهومی محض اند.۲. مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس‌های A و A' باهم برابرند.

۳. مقادیر ویژه ماتریس‌های بالامثلی همان عناصر روی قطر اصلی اند.

۴. دترمینان یک ماتریس با مجموع مقادیر ویژه آن ماتریس برابر است.

$$\text{فرض کنید } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad -15$$

با استفاده از قضیه کیلی-همیلتون مقدار $A^2 - 6A + 6I$ برابر است با

- A^2 . ۴ A^2 . ۳- A . ۲

A . ۱

-16 - با استفاده از روش لوربیر و با فرض $5tr(A) = tr(A^2) = -tr(A^3) = 10$ ، چندجمله‌ای مشخصه A برابر است با

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 + 3\lambda + 12 = 0 \quad . ۲$$

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - 3\lambda + 12 = 0 \quad . ۱$$

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - 3\lambda - 12 = 0 \quad . ۴$$

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 + 3\lambda - 12 = 0 \quad . ۳$$

$$\text{فرض کنید } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \sqrt{2} \\ 2 & 1 & 2 \\ \sqrt{2} & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad -17$$

هرگاه θ زاویه مورد نیاز در روش گیونز برای تبدیل ماتریس به یک ماتریس سه‌قطري باشد در این صورت:

$$\tan(\theta) = \sqrt{2} \quad . ۴$$

$$\tan(\theta) = 2 \quad . ۳$$

$$\tan(\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad . ۲$$

$$\tan(\theta) = 1 \quad . ۱$$

$$\text{فرض کنید } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad -18$$

اگر $Y^{(1)}$ و $Y^{(2)}$ بردارهای بدست آمده از روش کریلف با استفاده از بردار اولیه $Y^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ بودند، آنگاه مقدار $(Y^{(1)})^t \cdot Y^{(2)}$ برابر است با

84 . ۴

64 . ۳

24 . ۲

1 . ۱



-۱۹

محدوده مقادیر ویژه ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1 & 0.25 \\ 0.5 & 0.25 & 1.25 \end{bmatrix}$ کدام گزینه می‌تواند باشد.

۱. دایره‌ای به مرکز 1.25 و به شعاع 0.5
 ۲. دایره‌ای به مرکز 1 و به شعاع 0.5
 ۳. دایره‌ای به مرکز 1 و به شعاع 1
 ۴. دایره‌ای به مرکز 1.25 و به شعاع 0.75

-۲۰

جواب عمومی دستگاه $\begin{cases} u'(t) = 2u(t) + 6v(t) \\ v'(t) = -2u(t) - 5v(t) \end{cases}$ برابر است با

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} &= r_1 e^{-t} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + r_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix} & .\ 2 \\ \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} &= r_1 e^{-t} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + r_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} & .\ 4 \\ \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} &= r_1 e^{-t} \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} + r_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} & .\ 1 \\ \begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} &= r_1 e^{-t} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} + r_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} & .\ 3 \end{aligned}$$

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

نشان دهید ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ یک ماتریس معین مثبت است.

نمره ۱،۴۰

دستگاه معادله را به روش تجزیه کروت حل نمایید.

$$\begin{cases} 2x + 4y - 6z = -4 \\ x + 5y + 3z = 10 \\ x + 3y + 2z = 5 \end{cases}$$

نمره ۱،۴۰

دستگاه $\begin{cases} px + y = 1 \\ x + py + z = 2 \\ y + pz = 3 \end{cases}$ را در نظر بگیرید. نشان دهید روش ژاکوبی همگراست اگر و تنها اگر $p > \sqrt{2}$.

نمره ۱،۴۰

تقریبی از مقدار ویژه غالب سه مرحله کافی است)
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ را با استفاده از روش توانی و با انتخاب $Y^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ بدست آورید. (تا

نمره ۱،۴۰

با استفاده از تبدیلات گیونز، ماتریس سه قطری تبدیل نموده و سپس چندجمله‌ای مشخصه آن را بدست آورید.



| شماره سوال | پاسخ صحیح | وضعیت کلید |
|------------|-----------|------------|
| ۱ | ب | عادی |
| ۲ | ج | عادی |
| ۳ | د | عادی |
| ۴ | ب | عادی |
| ۵ | الف | عادی |
| ۶ | ج | عادی |
| ۷ | الف | عادی |
| ۸ | ب | عادی |
| ۹ | الف | عادی |
| ۱۰ | د | عادی |
| ۱۱ | د | عادی |
| ۱۲ | ب | عادی |
| ۱۳ | د | عادی |
| ۱۴ | ج | عادی |
| ۱۵ | ب | عادی |
| ۱۶ | الف | عادی |
| ۱۷ | ب | عادی |
| ۱۸ | ج | عادی |
| ۱۹ | ج | عادی |
| ۲۰ | د | عادی |



سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

۱- مثال ۲۴ صفحه ۱۴

نمره ۱،۴۰

۲- مثال صفحه ۷۹ کتاب درسی

نمره ۱،۴۰

۳- تمرین ۲۴ صفحه ۱۱۹ کتاب درسی

نمره ۱،۴۰

۴- مثال ۱۳ صفحه ۱۶۰ کتاب درسی

نمره ۱،۴۰

۵- مثال ۲۵ صفحه ۱۹۸ کتاب درسی